PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C07H

A2

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/15539

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

1. April 1999 (01.04.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/05997

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. September 1998

(21.09.98)

IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

197 41 715.9

22. September 1997 (22.09.97) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): AVENTIS RESEARCH & TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG [DE/DE]; D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MICULKA, Christian [AT/DE]; Gebeschusstrasse 36, D-65929 Frankfurt am Main (DE). WINDHAB, Norbert [DE/DE]; Akazienstrasse 28, D-65795 Hattersheim (DE). BRANDSTETTER, Tilmann [DE/DE]; Johannesallee 41, D-65926 Frankfurt am Main (DE). BURDINSKI, Gerhard [DE/DE]; Johannesweg 2, D-56355 Nastätten (DE).
- (74) Anwälte: BARDEHLE, Heinz usw.; Galileiplatz 1, D-81679 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, CA, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

- (54) Title: PENTOPYRANOSYL NUCLEOSIDE, AND PRODUCTION AND USE OF THE SAME
- (54) Bezeichnung: PENTOPYRANOSYL-NUCLEOSID, SEINE HERSTELLUNG UND VERWENDUNG

(57) Abstract

The invention relates to a pentopyranosyl nucleoside of formula (I) or formula (II), to the production of said pentopyranosyl nucleoside, and to its use for producing a therapeutic agent, a diagnostic agent and/or an electronic component.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Pentopyranosyl-Nucleosid der Formel (I) oder der Formel (II), deren Herstellung und Verwendung zur Herstellung eines Therapeutikums, Diagnostikums und/oder elektronischen Bauteils.

$$R^{4} \xrightarrow{Z} \xrightarrow{R^{2}} R^{3}$$

$$Q \xrightarrow{R^{1}} Q \xrightarrow$$

$$R^{\frac{d}{2}}$$

$$R^{\frac{d}{2}}$$

$$N$$

$$R^{\frac{d}{2}}$$

$$OS_{C_{1}}$$

$$OS_{C_{1}}$$

$$(II)$$

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

		ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AL	Albanien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Słowakei
AM	Armenien			LU	Luxemburg	SN	Senegal
AT	Österreich	FR	Frankreich	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AU	Australien	GA	Gabun	MC	Monaco	TD	Tschad
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien		•	TJ	Tadschikistan
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TM	Turkmenistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TR	Türkei
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TT	Trinidad und Tobago
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	ÜĀ	Ukraine
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UG	Uganda
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	US	Vereinigte Staaten von
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	UZ.	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JР	Japan	NE	Niger	-	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	•
СН	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun .		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
cz	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	Li	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		
ا جد	Latinite						

Pentopyranosyl-Nucleosid, seine Herstellung und Verwendung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Pentopyranosyl-Nucleosid der Formel (I) oder der Formel (II)

5

10

15

20

25

deren Herstellung und Verwendung zur Herstellung eines Therapeutikums, Diagnostikums und/oder elektronischen Bauteils.

Pyranosyl-Nucleinsäuren (p-NA's) sind im allgemeinen zur natürlichen RNA isomere Strukturtypen, bei denen die Pentose-Einheiten in der Pyranoseform vorliegen und durch Phosphodiestergruppen zwischen den Positionen C-2' und C-4' repetitiv verknüpft sind (Fig. 1). Unter "Nucleobase" werden dabei die kanonischen Nucleobasen A, T, U, C, G, aber auch die Paare Isoguanin/Isocytosin und 2,6-Diaminopurin/Xanthin und im Sinne der vorliegenden Erfindung auch andere Purine und Pyrimidine verstanden. p-NA's, und zwar die von der Ribose abgeleitete p-RNA's, wurden zum erstenmal von Eschenmoser et al. beschrieben (siehe Pitsch, S. et al. Helv. Chim. Acta 1993, 76, 2161; Pitsch, S. et al. Helv. Chim Acta 1995, 78, 1621; Angew. Chem. 1996, 108, 1619-1623). Sie bilden ausschließlich sogenannte Watson-Crick-gepaarte, d. h. Purin-Pyrimidin- und Purin-Purin-gepaarte, antiparallele, reversibel "schmelzende", quasi-lineare und stabile Duplices. Homochirale p-RNA-Stränge entgegengesetzten Chiralitätssinns paaren ebenfalls kontrollierbar und sind in

der gebildeten Duplex streng nicht-helical. Diese für den Aufbau supramolekularer Einheiten wertvolle Spezifität hängt mit der relativ geringen Flexibilität des Ribopyranosephosphat-Rückgrats sowie mit der starken Neigung der Basenebene zur Strangachse und der hieraus folgenden Tendenz zu intercatenarer Basenstapelung im resultierenden Duplex zusammen und läßt sich letzlich auf die Teilnahme eines 2',4'-cisdisubstituierten Ribopyranoserings am Aufbau des Rückgrates zurückführen. Diese wesentlich besseren Paarungseigenschaften machen p-NA's gegenüber DNA und RNA für Anwendung des Aufbaus supramolekularer Einheiten bevorzugten Paarungssystemen. Sie bilden ein zu natürlichen Nucleinsäuren orthogonales Paarungsystem, d. h. sie paaren nicht mit in der natürlich Form vorkommenden DNA's und RNA's, was im besonderen im diagnostischen Bereich von Bedeutung ist.

Eschenmoser et al. (1993, supra) hat zum ersten Mal eine p-RNA, wie in Fig. 2 dargestellt und nachstehend erläutert, hergestellt.

15

20

25

30

10

Hierbei wurde eine geeignete geschützte Nucleobase mit dem Anomerengemisch der Tetrabenzoyl-Ribopyranose durch Einwirken von Bis(trimethylsilyl)acetamid und einer Lewis-Säure wie z. B. Trimethylsilyl-trifluormethansulfonat zur Reaktion gebracht (analog H. Vorbrüggen, K. Krolikiewicz, B. Bennua, Chem. Ber. 1981, 114, 1234.). Unter Baseneinwirkung (NaOH in THF/Methanol/Wasser im Falle der Purine; gesättigter Ammoniak in MeOH im Falle der Pyrimidine) wurden die Acylschutzgruppen vom Zucker abgespalten, und das Produkt unter saurer Katalyse mit p-Anisaldehyddimethylacetal in 3',4'-Position geschützt. Das Diastereomerengemisch wurde in 2'-Stellung acyliert, das 3',4'methoxybenzylidengeschützte 2'-Benzoat durch saure Behandlung, Trifluoressigsäure in Methanol deacetalisiert, und mit Dimethoxytritylchlorid umgesetzt. Die 2'-3'-Wanderung des Benzoats wurde durch Behandlung mit p-Nitrophenol/4-(Dimethylamino)pyridin/Triethylamin/Pyridin/n-Propanol eingeleitet. Fast alle Reaktionen wurden durch Säulenchromatographie aufgearbeitet. Der so synthetisierte Schlüsselbaustein, das 4'-DMT-3'-benzoyl-1'-Nucleobasen-Derivat der Ribopyranose, wurde dann zum Teil phosphityliert bzw. über einen Linker an eine feste Phase gebunden.

Bei der anschließenden automatisierten Oligonucleotidsynthese wurde die trägergebundene Komponente in 4'-Position wiederholt sauer entschützt, ein Phosphoramidit unter Einwirkung eines Kupplungsreagenz, z. B. ein Tetrazolderivat, angekuppelt, noch freie 4'-Sauerstoffatome acetyliert und das Phosphoratom oxidiert, um so das oligomere Produkt.zu erhalten. Anschließend wurden die restlichen Schutzgruppen abgespalten, das Produkt über HPLC gereinigt und entsalzt.

Das beschriebene Verfahren von Eschenmoser et al. (1993, supra) zeigt jedoch folgende Nachteile:

10

1. Der Einsatz nicht anomerenreiner Tetrabenzoyl-pentopyranosen (H. G. Fletcher, J. Am. Chem. Soc. 1955, 77, 5337) zur Nucleosidierungsreaktion mit Nucleobasen verringert durch die Notwendigkeit rigoros geschnittener Chromatographien in den nachfolgenden Arbeitsschritten die Ausbeuten des Endproduktes.

15

2. Die Synthese ist mit fünf Reaktionsstufen, ausgehend von Ribopyranosen, die in 1'Stellung eine Nucleobase aufweisen, bis zum geschützten 3'-Benzoat, sehr langwierig und
eine Durchführung im industriellen Maßstab ist kaum möglich. Zusätzlich zu dem hohen
Zeitaufwand sind die erhaltenen Ausbeuten an Monomerbausteinen gering: 29 % im Falle
des Purinbausteins Adenin, 24 % im Falle des Pyrimidinbausteins Uracil.

20

25

3. Bei der Synthese der Oligonucleotide wird 5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazol als Kupplungsreagenz in der automatisierten p-RNA-Synthese eingesetzt. Die Konzentration dieses Reagenz in der Lösung von Tetrazol in Acetonitril ist dabei so hoch, daß regelmäßig das 5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazols in den dünnen Schläuchen des Synthesizers auskristallisiert und die Synthese somit zu einem vorzeitigen Ende kommt. Zudem wurde beobachtet, daß die Oligomeren mit 5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazol verunreinigt waren.

30 Al

4. Die beschriebene Aufarbeitung von p-RNA-Oligonucleotiden, im speziellen die Abspaltung der basenlabilen Schutzgruppen mit Hydrazinlösung, gelingt bei hohem Thymidin-Anteil im Oligomeren nicht immer.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, neue Pentopyranosyl-Nucleoside und ein Verfahren zu deren Herstellung bereitzustellen, bei dem die Herstellung der Pentopyranosyl-Nucleoside im größeren Maßstab als nach bekannten Verfahren ermöglicht werden soll und die oben beschriebenen Nachteile vermieden werden.

Ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Pentopyranosyl-Nucleosid der Formel (I),

$$\begin{array}{c|c}
R^4 & \xrightarrow{Z} & \\
N & & \\
N & & \\
N & & \\
N & & \\
R^1 & & \\
OS_{c_1} & & \\
\end{array}$$

(I),

worin

10

15

R1 gleich H, OH, Hal mit Hal gleich Br oder Cl, oder ein Rest ausgewählt aus

(III),

worin R^{12} , R^{13} , R^{14} und R^{15} unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils H, OR^7 , wobei R^7 die oben genannte Bedeutung hat, oder C_nH_{2n+1} , oder C_nH_{2n-1} , wobei n die oben genannte Bedeutung hat, bedeuten und

 R^5 , R^6 , R^7 und R^8 unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils H, C_nH_{2n+1} , oder C_nH_{2n-1} , wobei n die oben genannte Bedeutung hat, $-C(O)R^9$ mit R^9 gleich ein linearer oder verzweigter, gegebenenfalls substituierter Alkyl-, Aryl-, vorzugsweise Phenyl-Rest,

X, Y und Z unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils =N-, = $C(R^{16})$ - oder - $N(R^{17})$ - mit R^{16} und R^{17} unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils H oder C_nH_{2n+1} oder $(C_nH_{2n})NR^{10}R^{11}$ mit den oben genannten Bedeutungen, bedeutet, und S_{c1} und S_{c2} unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils H oder eine Schutzgruppe ausgewählt aus einer Acyl-, Trityl- oder Allyloxycarbonylgruppe, vorzugsweise eine Benzoyl- oder 4, 4'-Dimethoxytrityl-(DMT-)gruppe,

oder der Formel (II)

15

(II),

20

25

worin R1 gleich H, OH, Hal mit Hal gleich Br oder Cl oder oder ein Rest ausgewählt aus

X', jeweils =N-, =C(R^{16'})- oder -N(R^{17'})- bedeutet, wobei R^{16'} und R^{17'} unabhängig voneinander die oben genannte Bedeutung von R¹⁶ bzw. R¹⁷ haben, und S_{c1'} bzw. S_{c2'} die oben genannte Bedeutung von S_{c1} bzw. S_{c2} haben.

ausgenommen 4'-DMT-3'-benzoyl-ribopyranosyl-N-benzoyl-adenosin, N^6, N^6 -Dibenzoyl-9-(2'-O-benzoyl- β -D-ribo-pyranosyl)-adenosin, Ribopyranosyl-N-benzoyl-adenosin, 4'-DMT-3'-benzoyl-ribopyranosyl-urazil und Ribopyranosyl-urazil.

Das erfindungsgemäße Pentopyranosyl-Nucleosid ist im allgemeinen ein Ribo-, Arabino-, Lyxo- und/oder Xylo-pyranosyl-Nucleosid, vorzugsweise ein Ribopyranosyl-Nucleosid, wobei der Pentopyranosyl-Teil D-konfiguriert. aber auch L-konfiguriert sein kann.

Üblicherweise handelt es sich bei dem erfindungsgemäßen Pentopyranosyl-Nucleosid um ein Pentopyranosyl-purin, -2,6-diaminopurin, -6-purinthiol, -pyridin, -pyrimidin, -adenosin, -guanosin, -isoguanosin, -6-thioguanosin, -xanthin, -hypoxanthin, -thymidin, -cytosin, -isocytosin, -indol, -tryptamin, -N-phthaloyltryptamin, -uracil, -coffein, -theobromin, -theophyllin, -benzotriazol oder -acridin, insbesondere um ein Pentopyranosyl-purin, -pyrimidin, -adenosin, -guanosin, -thymidin, -cytosin, tryptamin, -N-phthalotryptamin oder -uracil.

Unter die erfindungsgemäßen Verbindungen fallen auch Pentopyranosyl-Nucleoside, die als
Linker verwendet werden können, d. h. als Verbindungen mit funktionellen Gruppen, die
kovalent an Biomoleküle, wie z. B. in ihrer natürlichen Form vorkommende oder

WO 99/15539 PCT/EP98/05997

modifizierte Nucleinsäuren, wie DNA, RNA aber auch p-NA's, vorzugsweise pRNA's, binden können. Dies ist überraschend, da für p-NA's noch keine Linker bekannt sind.

Beispielsweise fallen hierunter Pentopyranosyl-Nucleoside, bei denen R², R³, R⁴, R², R³ und/oder R4 ein 2-Phthalimidoethyl- oder Allyloxy-Rest bedeutet. Bevorzugt sind gemäß der vorliegenden Erfindung beispielsweise Uracil-basierende Linker, bei denen vorzugsweise die 5-Position des Uracils modifiziert wurde, Z. B. N-Phthaloylaminoethyluracil, auch Indol-basierende Linker, vorzugsweise Tryptaminderivate, wie z. B. N-Phthaloyltryptamin.

10

15

20

30

Überraschenderweise werden durch die vorliegende Erfindung auch besser handhabbare Pentopyranosyl-N,N-Diacylnucleoside, vorzugsweise Purine, insbesonders Adenosin, Guanosin oder 6-Thioguanosin, bereitgestellt, deren Nucleobase auf einfache Weise vollkommen entschützt werden können. Daher gehören zu der Erfindung auch erfindungsgemäße Pentopyranosyl-Nucleoside, bei denen R², R³, R⁴, R², R³ und/oder R⁴ ein Rest der Formel -N[C(O)R³]₂ bedeutet, insbesondere N⁶, N⁶-Dibenzoyl-9-(β-D-ribopyranosyl)-adenosin.

Weiterhin ist es überraschend, daß die vorliegende Erfindung Pentopyranosyl-Nucleoside bereitstellt, die ausschließlich am 3'-Sauerstoffatom des Pentopyranosid-Teils eine Schutzgruppe, vorzugsweise eine basen- oder metallkatalysiert abspaltbare Schutzgruppe, insbesondere eine Acylgruppe, besonders bevorzugt eine Benzoylgruppe, tragen. Diese Verbindungen dienen z. B. als Ausgangsstoffe zur direkten Einführung einer weiteren Schutzgruppe, vorzugsweise einer säure- oder basenlabilen Schutzgruppe, insbesondere einer Tritylgruppe, besonders bevorzugt eine Dimethoxytritylgruppe, an das 4'-Sauerstoffatom des Pentopyranosid-Teils ohne zusätzliche, die Ausbeute verringernde Schritte, wie z. B. zusätzliche Reinigungsschritte.

Darüberhinaus stellt die vorliegende Erfindung Pentopyranosyl-Nucleoside bereit, die ausschließlich am 4'-Sauerstoffatom des Pentopyranosid-Teils eine Schutzgruppe, vorzugsweise einer säure- oder basenlabilen Schutzgruppe, insbesondere einer Tritylgruppe, besonders bevorzugt eine Dimethoxytritylgruppe, tragen. Auch diese Verbindungen dienen

z. B. als Ausgangsstoffe zur direkten Einführung einer weiteren Schutzgruppe, vorzugsweise einer basen- oder metallkatalysiert abspaltbaren Schutzgruppe, insbesondere einer Acylgruppe, besonders bevorzugt einer Benzoylgruppe, z. B. an dem 2'-Sauerstoffatom des Pentopyranosid-Teils, ohne zusätzliche, die Ausbeute verringernde Schritte, wie z. B. zusätzliche Reinigungsschritte.

Im allgemeinen können die erfindungsgemäßen Pentopyranosid-Nucleoside in einer sogenannten Ein-Topf-Reaktion umgesetzt werden, was die Ausbeuten erhöht und daher besonders vorteilhaft ist.

Folgende Verbindungen stellen bevorzugte Beispiele der erfindungsgemäßen Pentopyranosvl-Nucleoside dar:

- A) [2',4'-Di-O-Benzoyl)-β-ribopyranosyl]-Nucleoside, insbesondere ein [2',4'-Di-O-Benzoyl)-β-ribopyranosyl]-adenin, guanin, -cytosin, -thymidin, -uracil, -xanthin oder -hypoxanthin, sowie ein N-Benzoyl-2',4'-di-O-benzoyl-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein -adenin, guanin oder -cytosin, sowie ein N-Isobutyroyl-2', 4'-di-O-benzoyl-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein -adenin, -guanin oder -cytosin, sowie ein O⁶-(2-Cyanoethyl)-N²-isobutyroyl-2',4'-di-O-benzoyl-ribopyranosyl-Nucleosid,
- insbesondere ein -guanin, sowie ein O⁶ (2-(4-Nitrophenyl)ethyl)-N²-isobutyroyl-2',4'-di-O-benzoyl-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein -guanin.
 - B) β-Ribopyranosyl-Nucleoside, insbesondere ein β-Ribopyranosyl-adenin, -guanin, -cytosin, -thymidin oder -uracil, -xanthin oder hypoxanthin, sowie ein N-Benzoyl-, N-Isobutyroyl-, O⁶ -(2-Cyanoethyl)- oder O⁶-(2-(4-Nitrophenyl)ethyl)-N²-isobutylroyl-β-ribopyranosyl-Nucleosid.
 - C) 4'-DMT-pentopyranosyl-Nucleoside, vorzugsweise ein 4'-DMT-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein 4'-DMT-ribopyranosyl-adenin, -guanin, -cytosin, -thymidin, -uracil, -xanthin, oder -hypoxanthin, sowie ein N-Benzoyl-4'-DMT-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein N-Benzoyl-4'-DMT-ribopyranosyl-adenin, -guanin oder -cytosin, sowie ein N-Isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein N-Isobutyroyl-4'-

DMT-ribopyranosyl-adenin, -guanin oder -cytosin sowie ein O^6 -(2-Cyanoethyl)- N^2 -isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein O^6 -(2-Cyanoethyl)- N^2 -isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-guanin, sowie ein O^6 -(2-(-4-Nitrophenyl)ethyl)- N^2 -isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein O^6 -(2-(-4-Nitrophenyl)ethyl)- N^2 -isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-guanin.

- D) β -Ribopyranosyl-N,N'-dibenzoyl-adenosin oder β -Ribopyranosyl-N,N'-dibenzoyl-guanosin.
- Als Vorstufe für die Oligonucleotidsynthese eigenen sich beispielsweise 4'-DMTpentopyranosyl-Nucleoside-2'-phosphitamid/-H-phosphonat, vorzugsweise ein 4'DMTribopyranosyl-Nucleosid-2'-phosphitamid/-H-phosphonat, insbesondere ein 4'-DMTribopyranosyl-adenin-, -guanin-, cytosin-, -thymidin-, -xanthin-, oder -hypoxanthin-, oder uracil-2'-phosphitamid/-H-phosphonat sowie ein N-Benzoyl-4'-DMT-ribopyranosyl-adenin-, -guanin- oder -cytosin-2'-phosphitamid/-H-phosphonat sowie ein N-Isobutylroyl-4'-DMTribopyranosyl-adenin-, -guanin- oder -cytosin-2'-phosphitamid/-H-phosphonat, O6-(2-Cyanoethyl)-4'-DMT-ribopyranosyl-guanin-, -xanthin-, -hypoxanthin-2'-phosphitamid/-H $phosphonat\ oder\ O^6-(2-(4-Nitrophenyl)ethyl)-N^2-isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-guan in$ und für die Kopplung an den festen Träger beispielsweise 4'-DMT-pentopyranosyl-Nucleoside-2'-succinat, vorzugsweise ein 4'-DMT-ribopyranosyl-Nucleosid-2'-succinat, insbesondere ein 4'DMT-ribopyranosyl-adenin-, -guanin-, -cytosin-, -thymidin-, -xanthin-, hypoxanthin- oder -uracil-2'-succinat sowie ein N-Benzoyl-4'-DMT-ribopyranosyl-adenin-, -guanin- oder -cytonsin-2'-succinat sowie ein N-Isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-adenin-, -guanin- oder -cytosin-2'- succinat, O-(2-Cyanoethyl)-4'-DMT-ribopyranosyl-guanin-, xanthin- oder -hypoxanthin-2'- succinat sowie ein O6-(2-(4-Nitrophenyl)ethyl)-N2-25 isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-guanin-2'-succinat.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Pentopyranosyl-Nucleosids der Formel (I) oder (II), bei dem ausgehend von dem ungeschützten Pentopyranosid

(a) in einem ersten Schritt zuerst die 2'-, 3'- oder 4'-Position des Pentopyranosids geschützt wird, und vorzugsweise

25

30

(b) in einem zweiten Schritt die andere Position an der 2'-, 3'- oder 4'-Position.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist nicht auf die in der zitierten Literatur beschriebenen Nucleobasen beschränkt, sondern kann überraschenderweise mit einer Vielzahl von natürlichen und synthetischen Nucleobasen erfolgreich durchgeführt werden. Zudem ist es besonders überraschend, daß das erfindungsgemäße Verfahren im Vergleich zu dem literaturbekannten Verfahren in großen Ausbeuten und mit einer Zeitersparnis von durchschnittlich 60% durchgeführt werden kann, was für die industrielle Anwendung besonders vorteilhaft ist. Zusätzlich sind mit dem erfindungsgemäßen Verfahren die bei dem in der Literatur beschriebenen Verfahren nötigen Reinigungsschritte, z. B. chromatographische Zwischenreinigungen, nicht notwendig und die Reaktionen können teilweise als sogenannte Ein-Topf-Reaktion durchgeführt werden, was die Raum/Zeit-Ausbeuten deutlich erhöht.

In einer besonderen Ausführungsform erfolgt im Falle einer 2'-geschützten Position eine Umlagerung der Schutzgruppe von der 2'-Position zur 3'-Position, die im allgemeinen in Gegenwart einer Base, insbesondere in Gegenwart von N-Ethyldiisopropylamin und/oder Triethylamin durchgeführt wird. Diese Reaktion kann gemäß der vorliegenden Erfindung besonders vorteilhaft in dem gleichen Reaktionsbehältnis als Ein-Topf-Reaktion durchgeführt werden.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist das Pyranosyl-nucleosid durch eine säurelabile, basenlabile oder metallkatalysiert abspaltbare Schutzgruppe S_{e1} , S_{e2} , S_{e1} oder S_{e2} geschützt, wobei vorzugsweise die Schutzgruppen S_{e1} und S_{e1} von den Schutzgruppen S_{e2} bzw. S_{e2} verschieden sind.

Im allgemeinen handelt es sich bei den genannten Schutzgruppen um eine Acylgruppe, vorzugsweise um eine Acetyl-, Benzoyl-, Nitrobenzoyl- und/oder Methoxybenzoyl-Gruppe, um Tritylgruppen, vorzugsweise um eine 4, 4'-Dimethoxytrityl-(DMT)-Gruppe oder um eine β -eliminierbare Gruppe, vorzugsweise eine Gruppe der Formel -OCH₂CH₂R¹⁸ mit R¹⁸ gleich ein Cyano- oder p-Nitrophenylrest oder eine Fluorenylmethyloxycarbonyl-(Fmoc)Gruppe.

30

Besonders bevorzugt ist es, wenn die 2'- oder 3'-Position durch eine basenlabile oder metallkatalysiert abspaltbare Schutzgruppe, vorzugsweise durch eine Acylgruppe, insbesondere durch eine Acetyl-, Benzoyl-, Nitrobenzoyl- und/oder Methoxybenzoylgruppe, geschützt wird und/oder die 4'-Position durch eine säure- oder basenlabile Schutzgruppe, vorzugsweise durch eine Trityl- und/oder Fmoc-Gruppe, insbesondere durch eine DMT-Gruppe geschützt wird.

Das erfindungsgemäße Verfahren kommt folglich im Gegensatz zu dem literaturbekannten Verfahren ohne acetalische Schutzgruppen, wie Acetale oder Ketale, aus, was zusätzliche chromatographische Zwischenreinigungen vermeidet und folglich die Reaktionen als Ein-Topf-Reaktionen mit überraschend hohen Raum/Zeit-Ausbeuten durchführen läßt.

Die Einführung der genannten Schutzgruppen erfolgt vorzugsweise bei tiefen Temperaturen, da diese hierdurch überraschenderweise selektiv eingeführt werden können.

So erfolgt beispielsweise die Einführung einer Benzoylgruppe durch Umsetzen mit Benzoylchlorid in Pyridin bzw. in einem Pyridin/Methylenchlorid-Gemisch bei tiefen Temperaturen. Die Einführung einer DMT-Gruppe kann beispielsweise durch Umsetzen mit DMTCl in Anwesenheit einer Base, z. B. von N-Ethyldiisopropylamin (Hünig-Base), und z. B. von Pyridin, Methylenchlorid oder einem Pyridin/Methylenchlorid-Gemisch bei Raumtemperatur erfolgen.

Es ist auch vorteilhaft, wenn nach der Acylierung und/oder nach der gegebenenfalls erfolgten Umlagerung von der 2'- zu der 3'-Position die Reaktionsprodukte chromatographisch gereinigt werden. Eine Reinigung nach der Tritylierung ist gemäß dem erfindungsgemäßem Verfahren nicht notwendig, was besonders vorteilhaft ist.

Das Endprodukt kann, falls notwendig, noch durch Kristallisation weiter gereinigt werden.

Ein anderer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines Ribopyranosyl-nucleosids, bei dem

25

- (a) eine geschützte Nucleobase mit einer geschützten Ribopyranose umgesetzt wird,
- (b) die Schutzgruppen von dem Ribopyranosyl-Teil des Produktes aus Schritt (a) abgespalten werden, und
- (c) das Produkt aus Schritt (b) gemäß dem oben näher beschriebenen Verfahren umgesetzt wird.

Hierbei ist es zur Vermeidung weiterer zeit- und materialaufwendiger Chromatographien vorteilhaft, nur anomerenreine geschützte Pentopyranosen, wie z. B. Tetrabenzoylpentopyranosen, vorzugsweise β-Tetrabenzoyl-ribopyranosen (R. Jeanloz, J. Am. Chem. Soc. 1948, 70, 4052), einzusetzen.

In einer weiteren Ausführungsform wird ein Linker gemäß Formel (II), worin R⁴ (C_nH_{2n})NR¹⁰'R¹¹ bedeutet und R¹⁰'R¹¹ über einen Rest der Formel (III) mit der bereits bezeichneten Bedeutung verbunden ist, durch folgendes Verfahren auf vorteilhafte Weise hergestellt:

- (a) eine Verbindung der Formel (II) mit R^{4} gleich $(C_nH_{2n})OS_{c3}$ oder $(C_nH_{2n})Hal$, worin n die oben genannte Bedeutung hat, S_{c3} eine Schutzgruppe, vorzugsweise eine Mesylat-Gruppe, und Hal Chlor oder Brom bedeutet, wird mit einem Azid, vorzugsweise in DMF, umgesetzt, anschließend wird
- 20 (b) das Reaktionprodukt aus (a), vorzugsweise mit Triphenylphosphin z. B. in Pyridin reduziert, dann
 - (c) das Reaktionsprodukt aus (b) mit einem entsprechenden Phthalimid, z. B. N-Ethoxycarbonylphthalimid, umgesetzt, und
 - (d) das Reaktionsprodukt aus (c) mit einer entsprechenden geschützten Pyranose, z. B. Ribosetetrabenzoat, umgesetzt, und schließlich
 - (e) werden die Schutzgruppen, z. B. mit Methylat, abgespalten, und
 - (f) die weiteren Schritte, wie oben bereits beschrieben, durchgeführt.

Daneben weisen Indolderivate als Linker den Vorzug der Fluoreszenzfähigkeit auf und sind daher für Nanotechnologie-Anwendungen, bei denen es ggf. um den Nachweis kleinster Substanzmengen geht, besonders bevorzugt. So wurden Indol-1-riboside bei N. N. Suvorov et al., Biol. Aktivn. Soedin., Akad. Nauk SSSR 1965, 60 und Tetrahedron 1967, 23, 4653

25

30

bereits beschrieben. Allerdings gibt es kein analoges Verfahren, 3-substituierte Derivate herzustellen. Im allgemeinen erfolgt ihre Herstellung über die Bildung eines Aminals der ungeschützten Zuckerkomponente und einem Indolin, welches dann durch Oxidation in das Indol-1-ribosid übergeführt wird. Beschrieben wurden z. B. Indol-1-glucoside und -1-arabinoside (Y. V. Dobriynin et al, Khim.-Farm. Zh. 1978, 12, 33), deren 3-substituierte Derivate meist über Vielsmeier-Reaktion hergestellt wurden. Dieser Weg der Einführung von Aminoethyl-Einheiten in 3-Position des Indols ist für eine industrielle Anwendung jedoch zu aufwendig.

- In einer weiteren besonderen Ausführungsform wird daher ein Linker gemäß Formel (I), worin X und Y unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils = $C(R^{16})$ mit R^{16} gleich H oder C_nH_{2n} und $Z = C(R^{16})$ mit R^{16} gleich $(C_nH_{2n})NR^{10}R^{11}$ durch folgendes Verfahren auf vorteilhafte Weise hergestellt:
 - (a) das entsprechende Indolin, z. B. N-Phthaloyltryptamin, wird mit einer Pyranose, z. B. D-Ribose, zum Nucleosidtriol umgesetzt, dann werden
 - (b) die Hydroxylgruppen des Pyranosyl-Teils des Produktes aus (a) vorzugsweise mit Acylgruppen, z. B. mittels Essigsäureanhydrid, geschützt, anschließend wird
 - (c) das Produkt aus (b), z. B. durch 2,3-Dichlor-5,6-dicyanoparachinon, oxidiert, und
 - (d) die Hydroxyl-Schutzgruppen des Pyranosyl-Teils des Produktes aus (c) werden z. B. mittels Methylat abgespalten und anschließend werden
 - (e) die weiteren Schritte, wie oben bereits beschrieben, durchgeführt.

Dieses Verfahren läßt sich jedoch nicht nur bei Ribopyranosen anwenden, sondern auch bei Ribofuranosen und 2'-Deoxyribofuranosen bzw. 2'-Deoxyribopyranosen, was besonders vorteilhaft ist. Als Nucleosidierungspartner der Zucker wird vorzugsweise Tryptamin, insbesondere N-Acylderivate des Tryptamins, vor allem N-Phthaloyltryptamin verwendet.

In einer weiteren Ausführungsform werden die 4'- geschützten, vorzugsweise, die 3', 4'- geschützten Pentopyranosyl-Nucleoside in einem weiteren Schritt phosphityliert oder an eine feste Phase gebunden.

٠. .

20

30

Die Phosphitylierung erfolgt beispielsweise durch Phosphorigsäuremonoallylester-diisopropyl-amidchlorid in Anwesenheit einer Base, z. B. N-Ethyldiisopropylamin oder durch Phosphortrichlorid und Imidazol bzw. Tetrazol und nachfolgender Hydrolyse unter Basenzusatz. Im ersten Fall ist das Produkt ein Phosphoramidit und im zweiten Fall ein H-Phosphonat. Die Bindung eines geschützten erfindungsgemäßen Pentopyranosyl-Nucleosids an eine feste Phase, z. B. "long-chain-alkylamino-controlled pore glass" (CPG, Sigma Chemie, München) kann beispielsweise wie bei Eschenmoser et al. (1993) beschrieben erfolgen.

Die erhaltenen Verbindungen dienen z. B. für die Herstellung von Pentopyranosyl-Nucleinsäuren.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Verfahren zur Herstellung einer Pentopyranosyl-Nucleinsäure, mit folgenden Schritten:

- 15 (a) in einem ersten Schritt wird ein geschütztes Pentopyranosyl-Nucleosid, wie oben bereits beschrieben, an eine feste Phase gebunden wird und
 - (b) in einem zweiten Schritt wird das gemäß Schritt (a) an eine feste Phase gebundene 3'-, 4'-geschützte Pentopyranosylnukleosid um ein phosphityliertes 3'-, 4'-geschütztes Pentopyranosyl-Nucleosid verlängert und anschließend z. B. durch eine wäßrige Jodlösung oxidiert wird, und
 - (c) Schritt (b) solange mit gleichen oder unterschiedlichen phosphitylierten 3'-, 4'- geschützten Pentopyranosyl-Nucleosiden wiederholt, bis die gewünschte Pentopyranosyl-Nucleinsäure vorliegt.
- Als Kupplungsreagenz bei Einsatz von Phosphoramiditen eignen sich saure Aktivatoren wie Pyridinium-Hydrochlorid besonders Benzimidazoliumtriflat, vorzugsweise nach Umkristallisieren in Acetonitril und nach Lösen in Acetonitril, da im Gegensatz zu 5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazol als Kupplungsreagenz keine Verstopfung der Kupplungsreagenz-Leitungen und eine Verunreinigung des Produktes erfolgt.

Als Kupplungsreagenz beim Einsatz von H-Phosphonaten eignen sich besonders Arylsulfonvichloride, Diphenylchlorophosphat, Pivaloylchlorid oder Adamantoylchlorid.

Weiterhin ist es vorteilhaft durch Zusatz von einem Salz, wie Natriumchlorid, zur schutzgruppenabspaltenden Hydrazinolyse von Oligonukleotiden, insbesondere yon p-NA's, vorzugsweise von p-RNA's, Pyrimidinbasen, vor allem Uracil und Thymin, vor einer Ringöffnung zu schützen, die das Oligonukleotid zerstören würde. Allyloxygruppen können vorzugsweise durch Palladium [Pd(0)]-Komplexe z. B. vor der Hydrazinolyse abgespalten werden.

In einer weiteren besonderen Ausführungsform können in Schritt (a) und/oder Schritt (b) auch Pentofuranosyl-nucleoside, z. B. das in ihrer natürlichen Form vorkommende Adenosin, Guanosin, Cytidin, Thymidin und/oder Uracil, eingebaut werden, was z. B. zu einer gemischten p-NA-DNA bzw. p-NA-RNA führt.

In einer anderen besonderen Ausführungsform kann in einem weiteren Schritt ein Allyloxy-Linker der Formel

$S_{c4}NH(C_nH_{2n})CH(OPS_{c5}S_{c6})C_nH_{2n}S_{c7}$

20

25

15

(IV),

worin S_{c4} und S_{c7} unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils eine Schutzgruppe insbesondere ausgewählt aus Fmoc und/oder DMT,

S_{c5} und S_{c6} unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils eine Allyloxyund/oder Diisopropylamino-Gruppe bedeuten, eingebaut werden. n hat die bereits oben genannte Bedeutung.

Ein besonders bevorzugter Allyloxy-Linker ist (2-(S)-N-Fmoc-O¹-DMT-O²-allyloxydiisopropylaminophosphinyl-6-amino-1,2-hexandiol).

30

Ausgehend von z. B. Lysin können somit in wenigen Reaktionsschritten amino-terminale Linker aufgebaut werden, die sowohl eine aktivierbare Phosphorverbindung als auch eine

WO 99/15539 PCT/EP98/05997

säurelabile Schutzgruppe, wie DMT, tragen und daher leicht in der automatisierbaren Oligonucleotidsynthese verwendet werden können (siehe z. B. P. S. Nelson et al., Nucleic Acid Res. 1989, 17, 7179; L. J. Arnold et al., WO 8902439). Das Repertoire wurde in der vorliegenden Erfindung durch einen Lysin-basierender Linker erweitert, bei dem anstelle der sonst üblichen Cyanoethyl-Gruppe am Phosphoratom eine Allyloxy-Gruppe eingebracht wurde, und welcher daher in vorteilhafter Weise in der Noyori-Oligonucleotid-Methode eingesetzt werden kann (R. Noyori, J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 1691-6).

5

10

15

20

25

30

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch eine Pentopyranosyl-Nucleinsäure, die mindestens ein erfindungsgemäßes Pentopyranosyl-Nucleosid und gegebenenfalls mindestens einen Allyloxy-Linker enthält.

p-NA's und insbesondere die p-RNA's bilden untereinander stabile Duplices und paaren im allgemeinen nicht mit den in ihrer natürlichen Form vorkommenden DNA's und RNA's. Diese Eigenschaft macht p-NA's zu bevorzugten Paarungssystemen.

Solche Paarungssysteme sind supramolekulare Systeme nicht kovalenter Wechselwirkung, die sich durch Selektivität, Stabilität und Reversiblität auszeichnen, und deren Eigenschaften bevorzugt thermodynamisch, d. h. durch Temperatur, pH-Wert und Konzentration beeinflußt werden. Solche Paarungssysteme können z. B. aufgrund ihrer selektiven Eigenschaften auch als "molekularer Klebstoff" für die Zusammenführung von unterschiedlichen Metallclustern zu Cluster-Verbänden mit potentiell neuen Eigenschaften verwendet werden [siehe z. B. R. L. Letsinger, et al., Nature 1996, 382, 607-9; P. G. Schultz et al., Nature 1996, 382, 609-11]. Folglich eignen sich die p-NA's auch für die Anwendung im Bereich der Nanotechnologie, beispielsweise zur Herstellung neuer Materialien, Diagnostika und Therapeutika sowie mikroelektronischer, photonischer bzw. optoelektronischer Bauteile und für das kontrollierte Zusammenführen molekularer Species zu supramolekularen Einheiten, wie z. B. für den (kombinatorischen) Proteinassemblies [siehe z. B. A. Lombardi, J. W. Bryson, W. F. DeGrado, Biomoleküls (Pept. Sci.) 1997, 40, 495-504], da p-NA's Paarungssysteme bilden, die stark und thermodynamisch kontrollierbar sind. Eine weitere Anwendung ergibt sich daher gerade im diagnostischen und drug discovery-Bereich durch die Möglichkeit, funktionelle, bevorzugt

WO 99/15539 PCT/EP98/05997

biologische Einheiten wie Proteine oder DNA/RNA-Abschnitte, mit einem p-NA-Code zu versehen, der nicht mit den natürlichen Nucleinsäuren interferiert (siehe z. B. WO93/20242).

- Ein anderer Gegenstand der Erfindung ist daher die Verwendung eines erfindungsgemäßen Pentopyranosyl-Nucleosid der Formel (I) oder (II) oder einer erfindungsgemäßen Pentopyranosyl-Nucleinsäure zur Herstellung eines Arzneimittels, wie z.B. eines Therapeutikums, eines Diagnostikums und/oder eines elektronischen Bauteils.
- Ein Biomolekül, z. B. DNA oder RNA, kann zum nicht-kovalenten Verbinden (Linken) mit 10 einem anderen Biomolekül, z. B. DNA oder RNA, verwendet werden, wenn beide Biomoleküle Abschnitte enthalten, die aufgrund komplementärer Sequenzen von Nucleobasen durch Ausbildung von Wasserstoffbrücken aneinander binden können. Derartige Biomoleküle finden z. B. in analytischen Systemen zur Signalamplifizierung Verwendung, wo ein in seiner Sequenz zu analysierendes DNA-Molekül über einen solchen nicht-kovalenten DNA-Linker zum einen an einen festen Träger immobilisiert, und zum anderen an ein signalverstärkendes branchedDNA-Molekül (bDNA) gebunden werden soll (siehe z.B. S. Urdea, Bio/Technol. 1994, 12, 926 oder US-Patent Nr. 5,624,802). Ein wesentlicher Nachteil der zuletzt beschriebenen Systeme ist, daß sie den Verfahren zur Nucleinsäure-Diagnostik durch Polymerase-Chain-Reaction (PCR) (K. Mullis, Methods 20 Enzymol. 1987, 155, 335) hinsichtlich der Empfindlichkeit bis jetzt unterlegen sind. Das ist u. a. darauf zurückzustihren, daß die nicht-kovalente Bindung vom festen Träger an das zu analysierende DNA-Molekül ebenso wie die nicht-kovalente Bindung des zu analysierenden DNA-Moleküls nicht immer spezifisch erfolgt, wodurch es zu einer Vermischung der Funktionen "Sequenzerkennung" und "nicht-kovalente Bindung" kommt. Die Verwendung 25 von p-NA's als orthogonales Paarungssystem, welches nicht in das DNA- bzw. RNA-Paarungsgeschehen eingreift, löst dieses Problem auf vorteilhafte Weise, wodurch die Empfindlichkeit der beschriebenen analytischen Verfahren deutlich erhöht werden kann.
- Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher die Verwendung eines erfindungsgemäßen Pentopyranosyl-Nucleosids der Formel (I) oder (II) oder einer erfindungsgemäßen Pentopyranosyl-Nucleinsäure zur Herstellung eines Konjugates

WO 99/15539 PCT/EP98/05997

enthaltend ein erfindungsgemäßes Pentopyranosyl-Nucleosid der Formel (I) oder (II) oder eine erfindungsgemäße Pentopyranosyl-Nucleinsäure und ein Biomolekül.

Konjugate sind im Sinne der vorliegenden Erfindung kovalent gebundene Hybride aus p-NA's und anderen Biomolekülen, vorzugsweise ein Peptid, Protein oder eine Nucleinsäure, beispielsweise ein Antikörper oder ein funktioneller Teil davon oder eine in ihrer natürlichen Form vorkommende DNA und/oder RNA. Funktionelle Teile von Antikörper sind beispielsweise Fv-Fragmente (Skerra & Plückthun (1988) Science 240, 1038), einzelkettige Fv-Fragmente (scFv; Bird et al. (1988), Science 242, 423; Huston et al. (1988) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 85, 5879) oder Fab-Fragmente (Better et al. (1988) Science 240, 1041).

10

15

20

30

Unter Biomolekül versteht man im Sinne der vorliegenden Erfindung eine natürlich vorkommende Substanz oder eine von einer natürlich vorkommenden Substanz abgeleitete Substanz.

In einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich dabei um p-RNA/DNA- bzw p-RNA/RNA-Konjugate.

Konjugate werden dann vorzugsweise verwendet, wenn die Funktionen "Sequenzerkennung" und "nicht-kovalente Bindung" in einem Molekül realisiert werden müssen, da die erfindungsgemäßen Konjugate zwei zueinander orthogonale Paarungssysteme enthalten.

Für die Herstellung von Konjugaten sind sowohl sequentielle als auch konvergente Verfahren geeignet.

In einem sequentiellen Verfahren wird z. B. nach erfolgter automatisierter Synthese eines p-RNA-Oligomeren direkt am gleichen Synthesizer - nach Umstellung der Reagenzien und des Kupplungsprotokolls - z. B. ein DNA-Oligonukleotid weitersynthetisiert. Dieser Vorgang läßt sich auch in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

WO 99/15539

25

In einem konvergenten Verfahren werden z. B. p-RNA-Oligomere mit Aminoterminalen-Linkern und z. B. DNA-Oligomere mit z. B. Thiol-Linkern in getrennten Vorgangen synthetisiert. Anschließend erfolgt vorzugsweise eine Jodacetylierung des p-RNA-Oligomeren und die Kupplung der beiden Einheiten nach literaturbekannten Protokollen (T. Zhu et al., Bioconjug. Chem. 1994, 5, 312).

Konvergente Verfahren erweisen sich aufgrund ihrer Flexibilität als besonders bevorzugt.

Unter dem Begriff Konjugat im Sinne der vorliegenden Erfindung sind auch sogenannte Arrays zu verstehen. Arrays sind Anordnungen von immobilisierten Erkennungsspecies, die speziell in der Analytik und Diagnostik eine wichtige Rolle bei der simultanen Bestimmung von Analyten spielen. Beispiele sind Peptide-Arrays (Fodor et al., Nature 1993, 364, 555) und Nucleinsäure-Arrays (Southern et al. Genomics 1992, 13, 1008; Heller, US-Patent Nr. 5,632,957). Eine höhere Flexibilität dieser Arrays kann dadurch erreicht werden, daß die Erkennungsspecies an codierende Oligonucleotide gebunden werden und die zugehörigen, komplementären Stränge an bestimmte Positionen auf einem festen Träger. Durch Aufbringen der codierten Erkennungsspecies auf den "anti-codierten" festen Träger und Einstellung von Hybridisierungsbedingungen werden die Erkennungsspecies an den gewünschten Positionen nicht-kovalent gebunden. Dadurch können verschiedene Typen von Erkennungsspecies, wie z. B. DNA-Abschnitte, Antikörper, nur durch Anwendung von Hybridisierungsbedingungen gleichzeitig auf einem festen Träger angeordnet werden (siehe Fig. 3.). Voraussetzung hierzu sind aber äußerst starke, selektive - um die codierenden Abschnitte möglichst kurz zu halten - und mit natürlicher Nucleinsäure nicht interferierender Codons und Anticodons notwendig. p-NA's, vorzugsweise p-RNA's eignen sich hierzu in besonders vorteilhafter Weise.

Unter dem Begriff "Träger" versteht man im Sinne der vorliegenden Erfindung Material, insbesondere Chipmaterial, das in fester oder auch gelartiger Form vorliegt. Als Trägermaterialien eignen sich beispielsweise Keramik, Metall, insbesondere Edelmetall, Gläser, Kunststoffe, kristalline Materialien bzw. dünne Schichten des Trägers, insbesondere der genannten Materialien bzw. dünne Schichten des Trägers, insbesondere der genannten Materialien, oder (bio)molekulare Filamente wie Cellulose, Gerüstproteine.

Die vorliegende Erfindung betrifft daher auch die Verwendung der erfindungsgemäßen Pentopyranosyl-Nucleinsäuren, vorzugsweise Ribopyranosyl-Nucleinsäuren zur Codierung von Erkennungsspecies, bevorzugt natürliche DNA- oder RNA-Stränge oder Proteine, insbesondere Antikörper oder funktionelle Teile von Antikörpern. Diese können dann gemäß Fig. 3. mit den zugehörigen Codons auf einem festen Träger hybridisiert werden. Damit kann auf einem festen Träger, der in Form eines Arrays mit Codons ausgestattet ist, nur durch Einstellung von Hybridisierungsbedingungen mit immer neuen Kombinationen von Erkennungsspecies an den gewünschten Positionen immer neue, diagnostisch nützliche Arrays aufgebaut werden. Wird dann der Analyt, beispielsweise eine biologische Probe wie Serum o. ä. aufgebracht, dann werden die zu detektierenden Species in einem bestimmten Muster auf dem Array gebunden, welches dann indirekt (z. B. durch Fluoreszenzmarkierung der Erkennungsspecies) oder direkt (z. B. durch Impedanzmessung am Anknüpfungspunkt der Codons) registriert wird. Dann wird die Hybridisierung durch geeignete Bedingung aufgehoben (Termperatur, Salze, Lösungsmittel, elektrophoretische Vorgänge) so daß wieder nur der Träger mit den Codons zurückbleibt. Dieser wird dann erneut mit anderen Erkennungsspecies beladen und wird z. B. für den gleichen Analyten für die Ermittlung eines anderen Musters verwendet. Die immer neue Anordnung von Erkennungsspecies im Array-Format und die Verwendung von p-NA's als Paarungssysteme ist gegenüber anderen Systemen. siehe z. B. WO 96/13522 (s. 16, unten), besonders vorteilhaft.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung bezieht sich daher insbesondere auch auf

ein Diagnostikum enthaltend ein oben beschriebenes Pentopyranosyl-Nucleosid oder ein erfindungsgemäßes Konjugat, wie oben bereits näher beschrieben.

Die folgenden Figuren und Beispiele sollen die Erfindung näher beschreiben, ohne sie zu beschränken.

30

15

20

25

BESCHREIBUNG DER FIGUREN

- Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus der Struktur von RNA in ihrer natürlich vorkommenden Form (links) und in Form einer p-NA (rechts).
- Fig. 2 zeigt schematisch die Synthese eines p-Ribo(A,U)-Oligonucleotids nach Eschenmoser et al. (1993).
 - Fig. 3 zeigt schematisch eine Anordnung von immobilisierten Erkennungsstrukturen (Arrays) auf einem festen Träger.

BEISPIELE

Beispiel 1

Synthese des $I-\{3'-O-Benzoyl-4'-O-[(4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl] \beta-D-ribo-pyranosyl\}-thymins$

Zuerst 4'-Substitution, dann 2'-Substitution, dann Wanderungsreaktion:

20

25

10

Schema 1

Unter Argonatmosphäre wurden 51,6 g (200 mmol) 1-(ß-D-Ribo-pyranosyl)-thymin A in 620 ml wasserfreiem Pyridin gelöst, 71,4 ml (2,1 eq.) N-Ethyldiisopropylamin und 100 g Molsieb (4 Å) zugesetzt und 15 min lang mit KPG-Rührer gerührt. Man löste 92 g (272 mmol; 1,36 eq.) Dimethoxytritylchlorid (DMTCl) in 280 ml (frisch von festem NaHCO₃ destilliertem) Chloroform, und tropfte diese Lösung innerhalb von 30 min bei -6 bis -5 °C

50 at 150 at 1

der Triollösung zu. Es wurde 1 h bei dieser Temp., dann über Nacht bei Raumtemperatur (RT.) gerührt, wieder gekühlt, und weitere 25 g (74 mmol; 0,37 eq.) DMTCl in 70 ml Chloroform zugesetzt. Man ließ auf RT. kommen und rührte 4 h nach.

Eine kleine Probe wurde entnommen, wäßrig aufgearbeitet und chromatographiert, um die analytischen Daten des 1-{4'-O-[(4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl]-ß-D-ribo-pyranosyl}-thymins zu erhalten:

¹H-NMR (300 MHz, CDCl3): 1,70 (bs, 2H, OH); 1,84 (d, 3H, Me); 2,90 (bs, 1 H, OH); 3,18, 3,30 (2m, 2H, H(5')), 3,62 (bs, 1H, H(3')); 3,70-3,82 (m, 8 H, 2 OMe, H(4'), H(2')); 5,75 (d, J = 9,5 Hz, 1H, H(1')), 6,85 (m, 4H, Harom); 6,96 (m, 1 H, Harom), 7,20 (m, 9H, Harom, H(6)), 8,70 (bs, 1H, H(3).)

Das Reaktionsgemisch wurde mit 2,46 g (20,5 mmol; 0,1 eq.) 4-Dimethylaminopyridin (DMAP) versetzt, auf -6 °C gekühlt und zwischen -6 und -1 °C innerhalb von 15 min 27,9 ml (0,24 mol; 1,2 eq.) Benzoylchlorid (BzCl) in 30 ml Pyridin zugetropft und 10 min nachgerührt. Zur vollständigen Umsetzung wurden dann im Abstand von 25 min noch jeweils 2,8 ml (24 mmol; 0,12 eq.) BzCl unter Kühlung zugesetzt und schließlich 20 min gerührt.

Man setzte bei RT. 460 ml wasserfreies Pyridin, 841 ml (11,2 mol; 56 eq.) n-Propanol, 44 g (0,316 mol; 1,58 eq.) p-Nitrophenol, 21,7 g (0,18 mol; 0,9 eq.) DMAP und 136 ml (0,8 mol; 4 eq.) N-Ethyldiisopropylamin zu und rührte bei 61 - 63 °C 48 h lang. Dann blieb der Ansatz bei RT. 60 h stehen. Das Reaktionsgemisch wurde noch 24 h lang auf 61 - 63 °C erwärmt, auf RT. abgekühlt und am Rotavapor eingeengt. Der Rückstand wurde in 2 l Ethylacetat aufgenommen, das Molsieb abfiltriert, die org. Phase dreimal mit je 1 l Wasser extrahiert, einmal mit 1,2 l 10 %iger Citronensäure 5 min ausgerührt und die org. Phase wieder abgetrennt, einmal mit 1 l Wasser und zum Abschluß mit 1 l gesättigter NaHCO₃-Lösung extrahiert. Die org. Phase wurde mit Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeengt (220 g Rückstand).

10

20

25

Man filtrierte zuerst über Kieselgel 60 (20 x 10 cm) mit Stufengradienten Heptan/Ethylacetat, 1:1 bis 0:1) zur Vorreinigung, dann wurde an Kieselgel 60 chromatographiert (30 x 10 cm; Stufengradient Dichlormethan/Ethylacetat, 1:0 bis 1:1).

Man erhielt: 40 g unpolare Fraktionen

52,9 g 1-{3'-O-Benzoyl-4'-O-[(4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl]-β-

D-ribo-pyranosyl}-thymin B

34,5 g verunreinigtes B

3,4 g polare Fraktionen

Die verunreinigte Fraktion wurde erneut chromatographiert (KG 60, 45 x 10 cm; Dichlormethan/Ethylacetat, 3:1) und lieferte weitere 11,3 g B.

Gesamtausbeute: 64,2 g (97 mmol) B, d. s. 48 % Ausbeute. ¹H-NMR entspricht.

Beispiel 2

10

15

20

Synthese des N^4 -Benzoyl-1- $\{3'-O-benzoyl-4'-O-\{(4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl\}$ - β - $D-ribo-pyranosyl\}$ -cytosins

Zuerst 2'-Substitution, dann 4'-Substitution, dann Wanderungsreaktion:

Schema 2

Alle Ansätze wurden unter N2-Atmosphäre durchgeführt.

N⁴-Benzoyl-1-(2'-O-benzoyl-ß-D-ribo-pyranosyl)-cytosin 2:

54,0 g (0,155 mol) N⁴-Benzoyl-1-(ß-D-ribo-pyranosyl)-cytosin 1 wurden in 830 ml Dimethylformamid (DMF) und 1,5 l Pyridin (beide Lösungsm. getrocknet und gelagert über Molsieb 3 Å) unter Erwärmen auf 124 °C gelöst. Bei -58° bis -63 °C wurden 23,0 g (0,163 mol; 1,05 eq.) BzCl, gelöst in 210 ml Pyridin, in 3,5 h zugetropft. Der Ansatz wurde im Kühlbad über Nacht gerührt. 90,3 g (1,5 mol; 10 eq.) n-Propanol wurden eingerührt und der Ansatz bei 40 °C im HV. eingeengt. Durch zweimalige Zugabe von 150 ml Toluol und erneutes Einengen wurden Pyridinreste entfernt. 124,3 g Rückstand wurden in 500 ml CH₂Cl₂ gelöst, zweimal mit je 300 ml halbkonzentrierter NaHCO₃-Lösung ausgerührt, und der ausgefallene Feststoff abfiltriert und getrocknet: 60,7 g Rückstand. Die CH₂Cl₂-Phase wurde eingeengt: 25,0 g. Getrennte Chromatographie an Kieselgel 60 (40 x 10 cm) mit Gradienten (AcOEt/iso-Hexan, 4:1, dann reines AcOEt, dann AcOEt/MeOH, 19:1 bis 2:1) lieferte (DC (Kieselgel, AcOEt)):

	16,8 g	2',4'-Dibenzoat	(24 %)	$R_f 0,5$.
	12,4 g	1	(23 %)	R _f 0,0.
20	35,4 g	2	(51%)	R _f 0, 14.

 $N^4-Benzoyl-1-\{3'-O-benzoyl-4'-O-[(4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl]-\beta-D-ribo-pyranosyl\}-cytosin\ 3:$

35,4 g (78 mmol) 2 wurden in 390 ml CH₂Cl₂ und 180 ml Pyridin (beides wasserfrei) gelöst und 0,94 (7,8 mmol; 0,1 eq.) DMAP, 34,6 ml (203 mmol; 2,6 eq.) N-Ethyldiisopropylamin und 33,1 g (98 mmol; 1;25 eq.) DMTCl zugegeben und 2 h bei RT. gerührt. DC (Kieselgel, AcOEt): R_f 0.6.

CH₂Cl₂ wurde bei 30 °C abgezogen, der Rückstand mit 640 ml Pyridin, 9,37 (78 mmol; 1,0 eq.) DMAP, 32,5 ml (234 mmol; 3,0 eq.) Et₃N, 21,7 g (156 mmol; 2,0 eq.) p-Nitrophenol und 93,8 g (1,56 mol; 20 eq.) n-Propanol versetzt und 42 h bei 65 °C gerührt. Der Ansatz wurde am HV. bei 50 °C eingeengt, zweimal mit je 250 ml Toluol versetzt und eingeengt.

Der Rückstand wurde in 1 l CH₂Cl₂ aufgenommen, dreimal mit je 500 ml verdünnter NaHCO₃-Lsg. ausgerührt, die org. Phase mit Na₂SO₄ getrocknet und eingeengt: 92,5 g Rückstand.

Chromatographie an Kieselgel 60 (50 x 10 cm) mit Gradienten (Methyl-tert. Butylether/iso-Hexan, 2:1 bis 4:1, dann Methyl-tert. Butylether/AcOEt, 1:4, dann AcOEt/MeOH, 1:1 bis 1:3) lieferte 44,7 g Produkt-haltige Fraktion, die aus 540 ml CH₂Cl₂/Methyl-tert. Butylether, 1:5, umkristallisiert wurde. Das Kristallisat wurde erneut aus 300 ml CH₂Cl₂/Methyl-tert. Butylether, 1:1, umkristallisiert.

3: DC (Kieselgel, CHCl₃/i-PrOH 49:1): R_f 0,14.

Man erhielt: 30.0 g N^4 -Benzoyl-1- $\{3'\text{-O-benzoyl-4'-O-[(4,4'\text{-dimethoxytriphenyl})-methyl]-}\beta\text{-D-ribo-pyranosyl}\}$ -cytosin 3

d. s. 51 % Ausbeute bezogen auf 2. ¹H-NMR entspricht.

15 Beispiel 3

10

20

Synthese des N^6 -Benzoyl-9-{3'-O-benzoyl-4'-O-[(4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl]- β -D-ribo-pyranosyl}-adenins

Zuerst 2'-Substitution, dann 4'-Substitution, dann Wanderungsreaktion:

Schema 3

9-(ß-D-Ribo-pyranosyl)-adenin 2:

٠. .

10

20

68,37 g (100 mmol) N⁶-Benzoyl-9-(2',3',4'-tri-O-benzoyl-β-D-ribo-pyranosyl)-adenin 1 wurde in 300 ml NH₃-gesättigtem MeOH über Nacht bei RT. gerührt und das Kristallisat abfiltriert: 23,5 g (88 %) 2.

DC (Kieselgel, AcOEt/MeOH 2:1): Rf 0,23.

¹H-NMR (300 MHz, DMSO): 3,56-3,78 (m, 3H, H(4'), H(5')); 4,04 (m, 1H, H(3')); 4.23 (ddd, J = 2,5, 8, 9,5 Hz, H(2')), 4,89 (d, J = 6 Hz, 1H, OH), 5,07 (d, J = 7 Hz, 1H, OH), 5,12 (d, J = 4 Hz, 1H, OH), 5,63 (d, J = 9,5 Hz, 1H, H(1')), 7,22 (s, 2H, NH2), 8,14 (s, 1H, H(2)), 8,29 (s, 1H, H(8)).

¹³C-NMR (75 MHz, DMSO): 65,0 (t, C(5')); 66,6 (s, C(4')), 68,1 (s, C(3')), 71,1 (s, C(2')), 79,6 (s, C(1')); 118.6 (C(5)); 139,5 (s, C(8)), 149,9 (s, C(4)), 152,5 (s, C(2)), 155,8 (s, C(6)).

N⁶,N⁶-Dibenzoyl-9-(ß-D-ribo-pyranosyl)-adenin 3:

- Unter N₂-Atmosphäre wurden 16,8 g (62,9 mmol) 2 in 500 ml wasserfreiem Pyridin suspendiert und auf -4 bis 10 °C gekühlt. Innerhalb von 20 min wurden 40 ml (199 mmol; 5 eq.) Trimethylchlorsilan zugetropft und 2,5 h unter Kühlung gerührt.
 - Bei -10 bis -15 °C wurden 36,5 ml (199 mmol; 5 eq.) Benzoylchlorid, gelöst in 73 ml Pyridin, innerhalb von 25 min zugesetzt, 10 min unter Kühlung und 2 h bei RT. gerührt (DC-Kontrolle (Kieselgel, AcOEt/Heptan 1:1): R_f 0,5). Man kühlte wieder auf -10 °C, ließ 136 ml H₂O (Temp. max. +8 °C) zulaufen und rührte über Nacht bei RT. Nach vollständigem Umsatz wurde das Lösungsmittel abgezogen und der Rückstand zweimal in je 200 ml Toluol aufgenommen und wieder eingedampft. Man versetzte mit je 500 ml Et₂O und H₂O, ließ mechanisch 2 h rühren, filtrierte das in beiden Phasen nur wenig lösliche
- Produkt ab, wusch mit Et₂O und H₂O und trocknete über P₂O₅ am HV.: 23,8 g (80 %) 3. DC (Kieselgel, AcOEt/MeOH 9:1): R_f 0,35.
 - ¹H-NMR (300 MHz, DMSO): 3,60-3,80 (m, 3H, H(4'), H(5')); 4,06 (bs, 1H, H(3')); 4.30 (ddd, J = 2,5, 8, 9,5 Hz, H(2')), 4,93 (d, J = 6 Hz, 1H, OH), 5,20 (d, J = 4 Hz, 1H, OH), 5,25 (d, J = 4 Hz, 1H, OH), 5,77 (d, J = 9,5 Hz, 1H, H(1')), 7,47 (m, 4 H, Harom), 7,60 (m, 2H, Harom), 7,78 (m, 4H, Harom), 8,70 (s, 1H, H-C(2), 8,79 (s, 1H, H(8)).
 - ¹³C-NMR (75 MHz, DMSO): 66,2 (t, C(5')); 66,5 (s, C(4')), 68,0 (s, C(3')), 71,0 (s, C(2')), 80,4 (s, C(1')); 112.42 (C(5)); 126,9 (s, C(5)), 126,9, 128,9, 133,3,

5 . S. S. S.

133,4 (arom. C), 146,0 (s, C(8)), 150,7 (s, C(4)), 151,8 (s, C(2)), 153,3 (s, C(6)), 172,0 (s, C=O)).

N⁶, N⁶-Dibenzoyl-9-(2'-O-benzoyl-ß-D-ribo-pyranosyl}-adenin 4:

Unter N₂-Atmosphäre wurden 26,4 g (55,5 mmol) 3 in 550 ml wasserfreiem CH₂Cl₂ und 55 ml Pyridin (jeweils gelagert über Molsieb) gelöst, mit 0,73 g (5,55 mmol; 0,1 eq.) DMAP versetzt und auf -87 bis -90 °C abgekühlt. Innerhalb von 1 h wurden 8,58 g (61 mmol; 1,1 eq.) BzCl in 14 ml Pyridin zugetropft und über 60 h (Wochenende) bei -78 °C belassen. Der Ansatz wurde eingeengt, zweimal mit je 100 ml Toluol versetzt und eingedampft, um Pyridin zu entfernen. Chromatographie an Kieselgel 60 (20 x 10 cm) mit Gradienten (AcOEt/Heptan, 1:1 bis 9:1) lieferte 23,2 g 4.

4: DC (Kieselgel, AcOEt): Rf 0,34.

15

N^6 -Benzoyl-9-{3'-O-benzoyl-4'-O-[(4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl]-B-D-ribo-pyranosyl}-adenin 5:

23,2 g (40 mmol) 4 wurden in 160 ml wasserfreiem CH₂Cl₂ gelöst und in Folge mit 14,9 g (56 mmol; 1,1 eq.) DMTCl und 17,7 ml (104 mmol; 2,6 eq.) N-Ethyldiisopropylamin versetzt. Nach 2 h Rühren bei RT wurden weitere 4,0 g (11,8 mmol; 0,3 eq.) DMTCl zugefügt und weitere 40 min gerührt. Der Ansatz wurde bei 350-520 mbar und 35 °C am Rotavapor eingeengt.

DC (Kieselgel, AcOEt/Heptan 1:1): Rf 0,18.

Der Rückstand wurde in 260 ml wasserfreiem Pyridin gelöst und in Folge mit 51 ml (679 mmol; 17 eq.) n-Propanol, 16,6 ml (120 mmol; 3 eq.) Et₃N, 11,1 g (80 mmol; 2 eq.) p-Nitrophenol und 5,3 g (44 mmol; 1,1 eq.) DMAP versetzt und bei 60-63 °C 23 h lang gerührt. Dann blieb der Ansatz bei RT. 21 h stehen. Das Reaktionsgemisch wurde am Rotavapor eingeengt. Der Rückstand wurde zweimal mit je 200 ml Toluol versetzt und eingeengt, in CH₂Cl₂ gelöst und dreimal mit Wasser extrahiert.

Chromatographie an Kieselgel 60 (30 x 10 cm) mit Gradienten (AcOEt/Heptan, 1:2 bis 1:0; dann AcOEt/MeOH, 1:0 bis 9:1) lieferte 13 g 5.

5: DC (Kieselgel, AcOEt/Heptan 4:1): Rf 0,2.

Man erhielt: 13 g N⁶-Benzoyl-9-{3'-O-benzoyl-4'-O-[(4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl]-\(\beta\)-D-ribo-pyranosyl}-adenin 5

d. s. 30 % Ausbeute bezogen auf 3. ¹H-NMR entspricht.

Zeitersparnis gegenüber literaturbekanntem Verfahren: 50 %.

Beispiel 4

15

20

Synthese von 9- $[3'-O-Benzoyl-4'-O-((4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl)-\beta-D-ribopyranosyl]-2-O-allyl-2-N-isobutyroyl-guanin$

Zuerst 3'-Substitution, dann 4'-Substitution:

9-[3'-O-Benzoyl- β -D-ribopyranosyl]-2-O-allyl-2-N-isobutyroyl-guanin B

Das G-Triol A (393 mg, 1.0 mmol) wurde in 4 ml trockenem Dichlormethan gelöst. Man versetzte mit Benzoesäuretrimethylorthoester (0.52 ml, 3.0 mmol) und Camphersulfonsäure (58 mg, 0.25 mmol) und rührte 15 h bei Raumtemperatur. Dann wurde die Mischung auf 0

WO 99/15539

°C abgekühlt und mit 2 ml einer auf 0 °C vorgekühlten Mischung von Acetonitril, Wasser und Trifluoressigsäure (50:5:1) versetzt. Man rührte 10 min und entfernte das Lösungsmittel im Vakuum. Der Rückstand wurde durch Flashchromatographie an Kieselgel (2.3 x 21 cm) mit Dichlormethan/Methanol 100:3 gereinigt. Man erhielt 25 mg (5%) 4-O-Benzoylverbindung 139 mg (28%) Mischfraktionen und 205 mg (41 %) der gewünschten 3-O-Benzoylverbindung **B**.

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 1.12, 1.14 (2 d, J = 7.0 Hz, 2 x 3 H, NHCOCHMe₂), 2.78 (hep, J = 7 Hz, 1 H, NHCOCHMe₂), 3.85 (dd, J = 6.0, 11.0 Hz, 1 H, H-5'_{eq}), 3.94 (app. T, J = 11.0 Hz, 1 H, H-5'_{ax}), 4.12 (ddd, J = 2.5, 6.0, 11.0 Hz, 1 H, H-4'), 4.52 (dd, J = 3.5, 9.5 hz, 1 H, H-2'), 5.00 (dt, J = 1.5, 6.0 Hz, 2 H, All), 5.19 (dq, J = 1.5, 10.0 Hz, 1 H, All), 5.39 (dq, 1.5, 16.5 Hz, 1 H, All), 5.85 (bt, J = 3.0 Hz, 1 H, H-3'), 5.97 (d, J = 9.5 Hz, 1 H, H-1'), 6.07 (ddd, J = 6.0, 10.0, 16.5 Hz, 1 H, All), 7.40-7.58 (m, 3 H, Bz), 8.10-8.16 (m, 2 H, Bz), 8.28 (s, 1 H, H-8).

9-[3'-O-Benzoyl-4'-O-((4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl)-β-D-ribopyranosyl]-2-O-allyl-2-N-isobutyroyl-guanin C

Das Diol B (101 mg, 0.2 mmol) wurde in 3.2 ml trockenem Dichlormethan suspendiert. Man versetzte mit 171 μl (1.0 mmol) N-Ethyldiisopropylamin, 320 μl (3.96 mmol) Pyridin und 102 mg (0.3 mmol) DMTCl und rührte bei Raumtemperatur. Nach 24 h wurden weitere 102 mg (0.3 mmol) DMTCl zugegeben und nochmals 24 h gerührt. Dann wurde mit 30 ml Dichlormethan verdünnt. Die Lösung wurde mit 20 ml 10%iger wässriger Citronensäurelösung und 10 ml gesättigter Natriumbicarbonatlösung gewaschen, über MgSO₄ getrocknet und im Vakuum eingeengt. Der Rückstand wurde durch Flashchromatographie an Kieselgel (2.3 x 20 cm) mit Dichlormethan/Methanol 100:1 gereinigt. Man erhielt 39 mg des bekannten, gewünschten Produkts C (24%).

Beispiel 5

20

25

30 Synthese von p-RNA-Linkersystemen

Im folgenden werden drei Wege beschrieben, die die Bereitstellung von Linkern, die einen Amino-Terminus aufweisen, der dann zum Anlinken funktioneller Einheiten verwendet werden kann, ermöglichen:

5.1 Uracil-basierender Linker

auf der Basis der Modifizierung der 5-Position des Uracils.

Die Herstellung von Hydroxyethyluracil 28 gelingt im großen Maßstab nach bekannter Methode (J.D. Fissekis, A. Myles, G.B. Brown, J. Org. Chem. 1964, 29, 2670) g-Butyrolacton 25 wurde mit Ameisensäuremethylester formyliert, das Natriumsalz 26 zum Harnstoffderivat 27 umgesetzt und dieses zum Hydroxyethyluracil 28 cyclisiert (Schema 4).

Schema 4: Synthese von Hydroxyethyluracil 28.

15

20

Schema 5: Synthese von N-Phthaloylaminoethyluracil 32.

Hydroxyethyluracil 28 wurde mit Methansulfonsäurechlorid in Pyridin mesyliert zu 29 (J.D. Fissekis, F. Sweet, J. Org. Chem. 1973, 38, 264).

Die folgenden Stufen wurden neu erfunden: Mit Natriumazid in DMF wurde 29 zum Azid 30 umgesetzt und dieses mit Triphenylphosphin in Pyridin zum Aminoethyluracil 31 reduziert. Die Aminofunktion in 31 wurde schließlich mit N-Ethoxycarbonylphtalimid geschützt (Schema 5). Nukleosidierung von Ribosetetrabenzoat 33 mit N-Phtaloylaminoethyluracil 32 lieferte das Ribosetribenzoat 34 in guten Ausbeuten. Das anomere Zentrum des Pyranoseringes ist, wie aus der Kopplungskonstanten zwischen H-C(1') und H-C(2') von J = 9.5 Hz klar ersichtlich, \(\beta\)-konfiguriert. Anschlie\(\beta\)ende Abspaltung der Benzoatschutzgruppen mit NaOMe in MeOH lieferte das Linkertriol 35. 35 wurde bei -78°C in Pyridin/Dichlormethan 1:10 in Gegenwart von DMAP mit Benzoylchlorid umgesetzt. Dabei erhielt man neben dem gewünschten 2'-Benzoat 36 (64%) auch 2',4'-dibenzoyliertes Produkt (22%), welches gesammelt und analog der Methanolyse von 34 nach 35 wieder in das Triol 35 umgewandelt wurde. Das 2'-Benzoat 36 wurde mit Dimethoxytritylchlorid in Gegenwart von Hünig-Base in Dichlormethan in 4'-Position in Ausbeuten größer 90% trityliert. Die Umlagerung von 4'-DMT-2'-benzoat 37 zum 4'-DMT-3'-benzoat 38 erfolgte in Gegenwart von DMAP, p-Nitrophenol und Hünig-Base in

n-Propanol/Pyridin 5:2. Nach Chromatographie wird 38 erhalten. 4'-DMT-3'-benzoat 38 wurde abschließend mit ClP(OAll)N(iPr)₂ in Gegenwart von Hünig-Base zum Phosphoramidit 39 umgesetzt (Schema 6). Dieser läßt sich ohne Änderung der Syntheseprotokolle für die automatisierte Oligonucleotidsynthese einsetzen.

Schema 6: Synthese des Linkerphosphoramidites 39.

Ausführung:

Synthese eines Uracil-Linker-Bausteins

5-(2-Azidoethyl)uracil (30)

10

5

Schema 6: Synthese des Linkerphosphoramidites 39.

Ausführung:

Synthese eines Uracil-Linker-Bausteins

5-(2-Azidoethyl)uracil (30)

$$\begin{array}{c|c}
 & O \\
 & O \\$$

ERSATZBLATT (REGEL 26)

1. Durchführung

In einem mit Innenthermometer und Rückflußkühler ausgestatteten 500-ml-Dreihalskolben wurden 26.0 g (0.11 mol) 29 in 250 ml DMF gelöst und mit 10.8 g (0.166 mol) Natriumazid versetzt. Die Suspension wurde im Anschluß vier Stunden bei 60°C gerührt (DC-Kontrolle, CHCl₃/MeOH 9:1). Das DMF wurde abdestilliert und der Rückstand mit 150 ml Wasser verrührt. Der Feststoff wurde abfiltriert, mit ca. 50 ml Wasser gewaschen und über Nacht im Vakuum im Exsiccator über Phosphorpentoxid getrocknet. Man erhielt 14.2 g (71%) 30 in Form eines farblosen Feststoffes vom Schmp. 230-235°C (u. Zers.).

2. Analytische Daten

5-(2-Azidoethyl)uracil (30):

15 Schmp.:

10

230-235°C u. Zersetz...

DC:

CHCl₃/MeOH 9:1, R_f 0.48.

UV (MeOH): λ_{max} 263.0 (7910).

IR (KBr):

3209s, 3038s, 2139s, 1741s, 1671s, 1452m, 1245m, 1210m.

¹**H-NMR** (300 MHz, d₆-DMSO): 2.46 (t, 2H, $J(CH_2CH_2N, CH_2CH_2N) = 7.0$, CH_2CH_2N); 3.40 (t, 2H, $J(CH_2CH_2N, CH_2CH_2N) = 7.0$, CH_2CH_2N); 7.36 (s, H-C(6));

11.00 (br. s, 2H, H-N(1), H-N(3)).

MS (ESI⁺): 180.0 [M+H]..

5-(2-Aminoethyl)uracil (31)

25

20

1. Durchführung

In einem mit Innenthermometer und Rückflußkühler ausgestatteten 250-ml-Dreihals-kolben wurden 14.2 g (78.0 mmol) 30 in 175 ml Pyridin suspendiert und mit 61.4 g (234 mmol) Triphenylphosphin versetzt²⁾. Es wurde fünf Stunden auf 60°C erwärmt und über Nacht bei Raumtemp. gerührt (DC-Kontrolle, CHCl₃/MeOH 5:1). Zur Suspension wurden 40 ml einer 25%igen Ammoniaklösung gegeben, die daraufhin aufklarte. Die Lösungsmittel wurden i.v.i.RV entfernt. Der Rückstand wurde in 200 ml CH₂Cl₂/MeOH 1:1 30 min bei Raumtemp. gerührt, der Niederschlag abfiltriert und mit CH₂Cl₂ gewaschen. Nach Trocknen im Vakuum im Exsiccator über Phosphorpentoxid erhielt man 10.0 g (85%) 31 vom Schmp. 214-220°C.

2. Analytische Daten

15

5-(2-Aminoethyl)uracil (31):

Schmp.: 214-220°C u. Gasentwicklung, vorher sintern.

DC: CHCl₃/MeOH/HOAc/H₂O 85:20:10:2, R_f 0.07.

UV (MeOH): λ_{max} 263.0 (6400).

²⁰ IR (KBr): 3430m, 3109s, 1628s, 1474m, 1394s, 1270s, 1176w, 1103m, 1021m, 966m, 908m, 838m.

¹**H-NMR** (300 MHz, d₆-DMSO): 2.21 (t, 2H, $J(CH_2CH_2N, CH_2CH_2N) = 6.8$, $CH_2CH_2N)$; 2.59 (t, 2H, $J(CH_2CH_2N, CH_2CH_2N) = 6.8$, CH_2CH_2N); 5.90 (v. br. s, 4H, H-N(1), H-N(3), NH₂); 7.19 (s, H-C(6)).

MS (ESI'): 153.9 [M-H].

5-(2-Phtalimidoethyl)uracil (32)

1. Durchführung

In einem 250-ml-Rundkolben wurden 9.6 g (61.8 mmol) 31 in 100 ml Wasser suspendiert und mit 6.64 g (62.6 mmol) Na₂CO₃ versetzt. Nach 15 min Rühren bei Raumtemp. gab man portionsweise 14.3 g (65 mmol) N-Ethoxycarbonylphtalimid zu und rührte drei Stunden bei Raumtemp. (DC-Kontrolle, CHCl₃/MeOH 5:1). Die nunmehr zähe, weiße Suspension wurde vorsichtig¹⁾ mit konz. Salzsäure auf pH 4 eingestellt und der weiße Niederschlag abfiltriert. Nach Wassen mit Wasser wurde der Feststoff im Vakuum im Exsiccator über Phosphorpentoxid getrocknet. Dies lieferte 16.0 g (91%) 32 vom Schmp. 324-327°C.

2. Analytische Daten

20

10

15

5-(2-Phtalimidoethyl)uracil (32):

Schmp.: 324-327°C u. Zersetz..

DC:

5

10

CHCl₃/MeOH 5:1, R_f 0.51.

UV (MeOH): λ_{max} 263.0 (5825); λ 298.0 (sh., 1380).

IR (KBr): 3446m, 3216m, 1772m, 1721s, 1707s, 1670s, 1390m.

¹H-NMR (300 MHz, d₆-DMSO): 2.49 (t, 2H, J(CH₂CH₂N, CH₂CH₂N) = 6.0, CH₂CH₂N); 3.71 (t, 2H, J(CH₂CH₂N, CH₂CH₂N) = 6.0, CH₂CH₂N); 7.24 (s, H-C(6)); 7.84 (m_c, 4H, NPht); 10.76 (br. s, H-N(1), H-N(3)).

MS (ESI'): 284.0 [M-H].

1-(2, 3, 4-Tri-O-benzoyl-β-D-ribopyranosyl)-5-(2-phtalimido-ethyl)uracil (34)

1. Durchführung

In einem 250-ml-Dreihalskolben, ausgestattet mit Argonüberleitung, Innenthermometer und Septum, wurden 7.00 g (24 mmol) 32 und 13.6 g (24 mmol) 33 in 120 ml Acetonitril suspendiert. Dann wurden mittels Spritze zunächst 12.2 ml (50 mmol) BSA zugegeben und nach 30 min Rühren nochmals 7 ml (28 mmol) BSA zugegeben. Nach kurzzeitigem Erwärmen auf 40°C klarte sich die Reaktionsmischung auf. Bei Raumtemp. wurden 13 ml (72 mmol) TMSOTf mittels Spritze zugegeben. Nach einer Stunde konnte noch keine Produktbildung beobachtet werden (DC-Kontrolle, AcOEt/n-Heptan 1:1). Daher wurden

weitere 13 ml (72 mmol) TMSOTf zugegeben. Im Anschluß wurde der Reaktionsansatz auf 50°C erwärmt. Nach 2.5 h Rühren bei 50°C (DC-Kontrolle) wurde auf RT. gekühlt, auf eine eiskalte Mischung von 250 ml AcOEt und 190 ml ges. NaHCO₃-Lösung und 10 min intensiv ausgerührt. Man wusch nochmals mit 100 ml NaHCO₃-Lösung und extrahierte die wäßrigen Phasen nochmals mit 100 ml AcOEt. Die ver. org. Phasen wurden mit MgSO₄ getrocknet und die Lösungsmittel i.V.i.RV entfernt. Nach Trocknen im ÖPV erhielt man 20.9 g Rohprodukt. Chromatographie an Kieselgel (h = 25 cm, φ = 5 cm, AcOEt/n-Heptan 1:1) lieferte ein DC-einheitliches, schaumiges Produkt, das mit Et₂O digeriert wurde. Filtration und Trocknen im ÖPV ergab 15 g (86%) 34.

10

15

20

25

2. Analytische Daten

1-(2, 3, 4-Tri-O-benzoyl- β -D-ribopyranosyl)-5-(2-phtalimidoethyl)uracil (34):

Schmp.: 124°C (sintern).

DC: AcOEt/n-Heptan 1:1, $R_f 0.09$.

UV (MeOH): λ_{max} 263.0 (11085); λ 299.0 (sh., 1530).

IR (KBr): 3238w, 3067w, 1772m, 1710s, 1452m, 1395m, 1266s, 1110s, 1070m, 1026m.

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 2.79 (m_e, 2H, CH₂CH₂N); 3.96 (m_e, 2H, CH₂CH₂N); 4.06 (dd, J(H_{eq}-C(5'), H_{ax}-C(5')) = 11.0, J(H_{eq}-C(5'), H-C(4')) = 6.0, H_{eq}-C(5')); 4.12 (t, J(H_{ax}-C(5'), H_{eq}-C(5')) = J(H_{ax}-C(5'), H-C(4')) = 11.0, H_{ax}-C(5')); 5.39 (dd, J(H-C(2'), H-C(1')) = 9.5, J(H-C(2'), H-C(3')) = 2.9, H-C(2')); 5.46 (ddd, J(H-C(4'), H_{ax}-C(5')) = 11.0, J(H-C(4'), H_{eq}-C(5')) = 6.0, J(H-C(4'), H-C(3')) = 2.9, H-C(4')); 6.26 (ψ t, J ≈ 2.6, H-C(3')); 6.36 (d, J(H-C(1'), H-C(2')) = 9.5, H-C(1')); 7.24-7.40, 7.44-7.56, 7.61-7.66, 7.72-7.80, 7.84-7.90, 8.06-8.13 (6m, 16H, 3 Ph, H-C(6)); 7.70, 7.82 (2 m_e, 4H, NPht); 8.37 (s, H-N(3)).

¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃): 21.19 (CH₂CH₂N); 36.33 (CH₂CH₂N); 64.07 (C(5')); 66.81, 68.22 (C(4'), C(2')); 69.29 (C(3')); 78.59 (C(1')); 112.42 (C(5)); 123.31,

132.05, 133.89 (6C, Pht); 128.33, 128.47, 128.47, 128.83, 128.86, 129.31, 129.83, 129.83, 129.94, 133.55, 133.62, 133.69 (18C, 3 Ph); 135.87 (C(6)); 150.39 (C(2)); 162.78 (C(4)); 164.64, 165.01, 165.41 (3C, O₂CPh); 168.43 (2C, CO-Pht).

 $MS (ESI^{+}): 730.2 [M+H].$

Anal.: ber. für $C_{40}H_{31}N_3O_{11}$ (729.70):

C 65.84, H 4.28, N 5.76;

gef.:

C 65.63, H 4.46, N 5.53.

5-(2-Phtalimidoethyl)-1-(β-D-ribopyranosyl)uracil (35)

BzO
$$0$$
 NPht 0 NPh

1. Durchführung

In einem 1-l-Rundkolben wurden 15 g (20 mmol) 34 in 500 ml MeOH gelöst, mit 324 mg (6 mmol) NaOMe versetzt und über Nacht unter Wasserausschluß bei Raum-temp. gerührt (DC-Kontrolle, AcOEt/n-Heptan 1:1). Es wurde solange Amberlite IR-120 zur entstandenen Suspension gegeben bis der pH-Wert <7 war. Es wurde der Feststoff in der Hitze gelöst, heiß vom Ionentauscher abfiltriert und mit MeOH gewaschen. Nach Entfernen der Lösungsmittel wurde der Rückstand zweimal mit je 150 ml Wasser coevaporiert. Dies lieferte 9 g Rohprodukt, das 10 min in 90 ml MeOH unter Rückfluß erhitzt wurde. Nach

Abkühlen auf Raumtemp. versetzte man mit 60 ml Et₂O und bewahrte über Nacht bei 4°C auf. Filtration, Waschen mit Et₂O und Trocknen im ÖPV lieferte 7.8 g (93%) 35.

2. Analytische Daten

5-(2-Phtalimidoethyl)-1-(β-D-ribopyranosyl)uracil (35):

Schmp.:

137°C (sintern).

DC:

25

CHCl₃/MeOH 5:1, R_f 0.21.

UV (MeOH): λ_{max} 263.0 (8575); λ 299.0 (sh., 1545).

IR (KBr): 3458s, 1772w, 1706s, 1400m, 1364m, 1304m, 1045m.

¹⁰ H-NMR (300 MHz, d₆-DMSO + 2 Tr. D₂O): 2.55 (m_e, 2H, CH₂CH₂N); 3.28-3.61 (m, 4H, H-C(2'), H-C(4'), H_{eq}-C(5'), H_{ax}-C(5')); 3.73 (m_e, 2H, CH₂CH₂N); 3.93 (m, H-C(3')); 5.50 (d, J(H-C(1'), H-C(2')) = 9.3, H-C(1')); 7.41 (s, H-C(6)); 7.84 (s, 4H, NPht).

¹³C-NMR (75 MHz, d₆-DMSO): 25.63 (CH₂CH₂N); 36.62 (CH₂CH₂N); 64.95 (C(5')); 66.29 (C(4')); 67.37 (C(2')); 71.12 (C(3')); 79.34 (C(1')); 110.39 (C(5)); 122.85, 131.54, 134.08 (6C, Pht); 137.92 (C(6)); 150.84 (C(2)); 163.18 (C(4)); 167.74 (2C, CO-Pht).

MS (ESI'): 416.1 [M-H].

20 1-(2'-O-Benzoyl-β-D-ribopyranosyl)-5-(2-phtalimidoethyl)-uracil

In einem ausgeheizten und mit Argon begasten 1-l-Vierhalskolben wurden 10.6 g (0.025 mmol) 5-(2-Phtalimidoethyl)-1-(β-D-ribopyranosyl)uracil in 20 ml Pyridin gelöst und mit 200 ml Dichlormethan versetzt. Es wurde auf -70°C abgekühlt, unter Kühlung 3.82 ml (0.033 mmol) Benzoylchlorid in 5 ml Pyridin und 20 ml Dichlormethan langsam zugetropft und 35 min bei -70°C gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde auf 600 ml gekühlte Ammoniumchlorid-Lösung gegossen und die wäßrige Phase mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden mit Wasser gewaschen, getrocknet und im Vakuum

zur Trockene eingeengt. Chromatographie über Kieselgel (Ethylacetat/Heptan 1:1) lieferte 7.9 g (60%) 1-(2'-O-Benzoyl-β-D-ribopyranosyl)-5-(2-phtalimidoethyl)-uracil.

DC: R_f 0.24 (Ethylacetat/Heptan 4:1).

¹H-NMR (300 Mhz, d₆-DMSO): 2.67 (m_c, 2H, CH₂CH₂N); 3.66-3.98 (m, 5H, H-C(4'), H_{eq}-C(5'), H_{ax}-C(5'), CH₂CH₂N); 4.51 (t, 1H, H-C(3')); 4.98 (dd, 1H, H-C(2')); 6.12 (d, 1H, H-C(1')); 7.19 (s, 1H, H-C(6)); 7.29-7.92 (m, 9H, OBz, NPht).

1-(2-O-Benzoyl-4-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-β-D-ribopyranosyl)-5-(2-phtalimidoto ethyl)uracil

5.6 g (10.73 mmol) 1-(2-O-Benzoyl-β-D-ribopyranosyl)-5-(2-phtalimidoethyl)uracil wurden in 60 ml Dichlormethan gelöst, mit 4.72 g (13.95 mmol) 4,4'-Dimethoxytritylchlorid und 2.4 ml (13.95 mmol) N-Ethyl-diisopropylamin versetzt und 20 min bei RT gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde mit 100 ml Dichlormethan verdünnt, mit Natriumhydrogencarbonat-Lösung und 20% Zitronensäure-Lösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum zur Trockene eingeengt. Chromatographie über Kieselgel (Ethylacetat/Heptan 1:1 + 2% Triethylamin) lieferte 7.7 g (87%) 1-(2-O-Benzoyl-4-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-β-D-ribopyranosyl)-5-(2-phtalimidoethyl)uracil.

DC: R_f 0.53 (Ethylacetat/Heptan 1:1 + 2% Triethylamin).

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 2.64 (m_e, 2H, CH₂CH₂N); 3.12 (m_e, 1H, H-C(4')); 3.59-3.63 und 3.72-3.92 (m, 5H, H-C(3'), H_{eq}-C(5'), H_{ax}-C(5'), CH₂CH₂N); 3.81 und 3.82 (s, 6H, CH₃O); 4.70 (dd, 1H, H-C(2')); 6.09 (d, 1H, H-C(1')); 7.05 (s, 1H, H-C(6)); 6.84-7.90 (m, 22H, ODmt, OBz, NPht).

25

15

1-(3-O-Benzoyl-4-O-(4,4'-dimethoxytrityl)- β -D-ribopyranosyl)-5-(2-phtalimidoethyl)uracil

3 g (3.63 mmol) 1-(2-O-Benzoyl-4-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-β-D-ribopyranosyl)-5-(2-phtalimidoethyl)uracil, 1 g (7.26 mmol) 4-Nitrophenol, 0.44 g (3.63 mmol) 4-(Dimethylamino)pyridin und 3.75 ml (21.78 mmol) N-Ethyl-diisopropylamin wurden in 5.6

15

20

ml iso-Propanol und 25 ml Pyridin gelöst, auf 65°C erhitzt und 3 Tage bei 65°C gerührt. Die Lösung wurde im Vakuum zur Trockene eingeengt und der Rückstand in 150 ml Dichlormethan gelöst. Nach Waschen mit 20% Zitronensäure-Lösung Natriumhydrogencarbonat-Lösung wurde über Magnesiumsulfat getrocknet. Chromatographie über Kieselgel (Ethylacetat/Dichlormethan/iso-Hexan 2:1:1) lieferte 2.27 (76%)1-(3-O-Benzoyl-4-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-β-D-ribopyranosyl)-5-(2phtalimidoethyl)uracil.

DC: R_f 0.27 (Ethylacetat/iso-Hexan 2:1 + 1% Triethylamin).

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 2.39 (m_c, 2H, CH₂CH₂N); 2.53 (m_c, 1H, H_{eq}-C(5')); 3.30 (dd, 1H, H-C(2')); 3.55 (m_c, 1H, H_{ax}-C(5')); 3.69 (m_c, 2H, CH₂CH₂N); 3.78 und 3.79 (s, 6H, CH₃O); 3.79-3.87 (m, 1H, H-C(4')); 5.74 (d, 1H, H-C(1')); 5.77 (m_c, 1H, H-C(3')); 6.92 (s, 1H, H-C(6)); 6.74-8.20 (m, 22H, ODmt, OBz, NPht).

1-{2'-O-[(Allyloxy)(diisopropylamino)phosphino]-3'O-benzoyl-4'-O-[(4,4'-

dimethoxytriphenyl)-methyl]- β-D-ribo-pyranosyl}-5-(2-phtalimidoethyl)- uracil

88 mg (0.11 mmol) 1-(3-O-Benzoyl-4-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-β-D-ribopyranosyl)-5-(2phtalimidoethyl)uracil wurden in 5 ml Dichlormethan gelöst, mit 75 µl (0.44 mmol) N-Ethyl-diisopropylamin und 70 µl (0.3 mmol) Allyloxy-chlor-(diisopropylamino)phosphin versetzt und 3 h bei Raumtemperatur gerührt. Nach Zugabe von weiteren 35 µl (0.15 mmol) Allyloxy-chlor-(diisopropylamino)phosphin zur Vervollständigung der Reaktion wurde noch 1 h bei Raumtemperatur gerührt und das Reaktionsgemisch im Vakuum eingeengt. Chromatographie an Kieselgel (Ethylacetat/Heptan: Gradient 1:2 auf 1:1 auf 2:1, jeweils mit 2% Triethylamin) lieferte 85 (76%)1-{2'-0mg [(Allyloxy)(diisopropylamino)phosphino]-3'O-benzoyl-4'-O-[(4,4'-dimethoxytriphenyl)methyl]- β-D-ribo-pyranosyl}-5-(2-phtalimidoethyl)- uracil.

DC: R_f 0.36 (Ethylacetat/Heptan 2:1).

¹H-NMR (CDCl₃, 300 MHz): Ausgewählte charakteristische Lagen: 2.28, 2.52 (2 dd, J = 5.0, 11.0 Hz, 2 H, 2 H-5'), 3.79, 3.78 (app. 2 s, 12 H, OMe), 6.14 (1 bs, 1 H, H-3').

³¹P-NMR (CDCl₃): 149.8, 150.6

5.2 Indol-basierender Linker

N-Phthaloyltryptamin wird wie beschrieben aus Phthalsäureanhydrid und Tryptamin erhalten (Kuehne et al J. Org. Chem. 43, 13, 1978, 2733-2735). Dieses wird mit Boran-THF zum Indolin reduziert (analog A. Giannis, et al., Angew. Chem. 1989, 101, 220).

Das 3-substituierte Indolin wird zuerst mit Ribose zum Nucleosidtriol und dann mit Essigsäureanhydrid zum Triacetat umgesetzt. Man oxidiert mit 2,3-Dichlor-5,6-dicyanoparachinon und spaltet die Acetate mit Natriummethylat, benzoyliert selektiv in 2'-Position, DM-trityliert selektiv in 4'-Position, und führt die Wanderungsreaktion zum 3'-Benzoat durch. Die Bildung des Phosphoramidits erfolgt wie üblich. Dieser läßt sich ohne Änderung der Syntheseprotokolle für die automatisierte Oligonucleotidsynthese einsetzen.

<u>Durchführung</u>

3-(N-Phthaloyl-2-aminoethyl)-indolin

15

20

25

Unter Stickstoffatmosphäre wurden 51.4 g (177 mmol) Phthaloyltryptamin A in 354 ml 1M Boran-THF-Lösung (2 eq.) gelöst und auf 0 °C abgekühlt. Bei 0 °C wurde langsam 354 ml Trifluoressigsäure zugetropft (Vorsicht: Gasentwicklung) und 30 min. nachgerührt (DC-Kontrolle: EtOAc). Dann wurden 17.3 ml Wasser zugegeben, 10 min gerührt und im Vak. eingeengt. Der Rückstand wurde in 10%iger NaOH-Lösung / Dichlormethan gelöst, die organische Phase wurde abgetrennt, über NaSO₄ getrocknet, filtriert und im Vak. eingeengt. Der Rückstand (50.9 g) wurde aus heißem Ethanol (3 l) umkristallisiert. Man erhielt 41.4 g B, Smp. 161-162°C. Die Mutterlauge wurde im Vakuum eingeengt und der Rückstand erneut aus Ethanol umkristallisiert. Man erhielt weitere 3.2 g B, Smp. 158-159 °C.

Gesamtausbeute: 44.6 g (153 mmol) B, d. s. 86%.

¹H-NMR (CDCl₃, 300 MHz): 1.85-2.00, 2.14-2.28 (2 m, 2 x 1 H, C $\underline{\text{H}}_2\text{CH}_2\text{NPhth}$), 2.70 (bs, 1 H, NH), 3.24-3.38, 3.66-3.86 (2 m, 5 H, CH₂C $\underline{\text{H}}_2\text{NPhth}$, H-2a, H-2b, H-3), 6.62 (d, J = 8.0 Hz, 1 H, H-7), 6.66-6.72 (m, 1 H, H-5), 6.99 (app t, J = 7.5 Hz, 1 H, H-6), 7.14 (d, J = 8.0 Hz, 1 H, H-4), 7.64-7.74, 7.78-7.86 (2 m, 2 x 2 H, Phth).

¹³C-NMR (CDCl₃, 75 MHz): 32.70, 36.10 (2 t, C-2, CH₂CH₂NPhth), 39.62 (d, C-3), 53.04 (t, CH₂NPhth), 109.65 (d, C-7), 118.74 (d, C-5), 123.25 (d, Phth), 123.92, 127.72 (2 d, C-4, C-6), 131.81 (s, C-3a), 132.14 (s, Phth), 133.99 (d, Phth), 151.26 (s, C-7a), 168.38 (s, C=O).

Ber: C: 73.96, H: 5.52, N: 9.58; gef.: C: 73.89, H: 5.57, N: 9.55.

10 MS (EST): 293 (MHT, 100%)

15

25

3-(N-Phthaloyl-2-aminoethyl)-1-(2',3',4'-tri-O-acetyl-β-D-ribo-pyranosyl)-indol

Unter Stickstoffatmosphäre wurden 45.2 g (155 mmol) A und 23.2 g (155 mmol; 1.0 eq.) D-Ribose in 750 ml trockenem Ethanol suspendiert und 4 h zum Rückfluß erhitzt (DC-Kontrolle: CH₂Cl₂/MeOH 10:1). Nach abkühlen auf RT wurde im Vak. eingeengt. Der Rückstand wurde in 300 ml Pyridin gelöst und unter Eiskühlung mit 155 ml Essigsäureanhydrid versetzt. Nach 15 min. wurde das Eisbad entfernt und 18 h bei RT gerührt (DC-Kontrolle: EtOAc/iso-Hexan 1:1). Diese Lösung wurde im Vakuum eingeengt und 3 mal mit je 300 ml Toluol coevaporiert. Das erhaltene Öl wird in 900 ml Dichlormethan gelöst und unter Eiskühlung mit 38.8 g (171 mmol; 1.1 eq.) 2,3-Dichlor-5,6-dicyanoparachinon versetzt. Nach 15 min. wurde das Eisbad entfernt und 1.5 h bei RT nachgerührt (DC-Kontrolle: EtOAc/iso-Hexan 1:1). Der ausgefallene Niedercshlag wurde abgesaugt und mit Dichlormethan gewaschen und verworfen. Das Filtrat wurde mit 600 ml ges. NaHCO₃-Lösung gewaschen. Der dabei ausgefallene Niederschlag wurde erneut abgesaugt und mit Dichlormethan gewaschen und verworfen. Die vereinigten organischen

Extrakte wurden über NaSO₄ getrocknet und im Vak. eingeengt. Der Rückstand (90.9 g) wurde durch Flashchromatographie an Kieselgel 60 gereinigt (10 x 25 cm; EtOAc/iso-Hexan 2:3).

Man erhielt: 21.5 g reines B und 46.83 g Mischfraktionen, die nach erneuter Chromatographie weitere 20.4 g reines B lieferten.

Gesamtausbeute: 41.9 g (76 mmol) B, d. s. 49%.

¹H-NMR (CDCl₃, 300 MHz): 1.64, 1.98, 2.19 (3 s, 3 x 3 H, Ac), 3.06 (t, J = 8.0 Hz, 2 H, CH₂CH₂NPhth), 3.81-4.00 (m, 4 H, H-5'ax, H-5'eq, CH₂NPhth), 5.13 (ddd, J = 2.5, 6.0, 10.5 Hz, 1 H, H-4'), 5.36 (dd, J = 3.5, 9.5 Hz, 1 H, H-2'), 5.71 (d, J = 9.5 Hz, 1 H, H-1'), 5.74 (app t, J = 3.0 Hz, 1 H, H-3'), 7.02 (s, 1 H, H-2), 7.04-7.10, 7.13-7.19 (2 m, 2 x 1 H, H-5, H-6), 7.33 (d, J = 8.0 Hz, 1 H, H-7), 7.58-7.66, 7.72-7.80 (2 m, 5 H, Phth, H-4).

¹³C-NMR (CDCl₃, 75 MHz): 20.23, 20.65, 20.87 (3 q, Ac), 24.41, 38.28 (2 t, CH₂CH₂), 63.53 (t, C-5'), 66.24, 68.00, 68.64 (3 d, C-2', C-3', C-4'), 80.33 (d, C-1'), 109.79 (d, C-7), 113.95 (s, C-3), 119.33, 120.39, 122.04, 122.47 (4 d, C-4, C-5, C-6, C-7), 123.18 (d, Phth), 128.70, 132.17 (2 s, C-3a, Phth), 133.87 (d, Phth), 136.78 (s, C-7a), 168.24, 168.77, 169.44, 169.87 (4 s, C=0).

Ber: C: 63.50, H: 5.15, N: 5.11; gef.: C: 63.48, H: 5.16, N: 5.05.

MS (ES⁺): 566 (M+NH₄+, 82%), 549 (MH+, 74%), 114 (100%).

20

3-(N-Phthaloyl-2-aminoethyl)-1-β-D-ribo-pyranosyl-indol

25

Unter Stickstoffatmosphäre wurden 44.1 g (80 mmol) A in 400 ml wasserfreiem Methanol gelöst. Unter Eiskühlung versetzte man mit 4.0 ml 30%iger Natriummethylatlösung und

20

25

rührte dann 18 h bei RT. Der ausgefallene Niederschlag wurde abgesaugt und mit kaltem Ethanol gewaschen. Das Filtrat wurde im Vak. eingeengt. Der Rückstand wurde in Dichlormethan aufgenommen. Diese Lösung wurde mit ges. NaHCO₃-Lösung gewaschen, über NaSO₄ getrocknet und im Vak. eingeengt. Der erhaltene Rückstand wurde zusammen mit dem aus der Reaktionslösung ausgefallenen Niederschlag aus heißem Ethanol umkristallisiert. Man erhielt 22.6 g B, Smp. 196-198 °C. Die Mutterlauge wurde im Vakuum eingeengt und der Rückstand erneut aus Ethanol umkristallisiert. Man erhielt weitere 9.2 g B, Smp. 188-194 °C.

Gesamtausbeute: 25.8 g B, d. s. 76%.

¹H-NMR (MeOD, 300 MHz): 3.09 (app. t, J = 7.0 Hz, 2 H, $C\underline{H}_2CH_2NPhth$), 3.64-3.98 (m, 5 H, H-4', H-5'ax, H-5'eq, $C\underline{H}_2NPhth$), 4.05 (dd, J = 3.5, 9.5 Hz, 1 H, H-2'), 4.22 (app t, J = 3.0 Hz, 1 H, H-3'), 5.65 (d, J = 9.5 Hz, 1 H, H-1'), 6.95-7.05, 7.09-7.16 (2 m, 2 x 1 H, H-5, H-6), 7.25 (s, 1 H, H-2), 7.44 (d, J = 8.0 Hz, 1 H, H-7), 7.60 (d, J = 8.0 Hz, 1 H, H-4), 7.74-7.84 (m, 4 H, Phth).

¹³C-NMR (d₆-DMSO, 75 MHz): 23.87, 37.79 (2 t, $\underline{CH_2CH_2NPhth}$), 64.82 (t, C-5'), 66.74 (d, C-4'), 68.41 (d, C-2'), 71.42 (d, C-3'), 81.37 (d, C-1'), 110.42 (d, C-7), 111.05 (s, C-3), 118.17, 119.21, 121.36, 122.92, 123.80 (5 d, C-2, C-4, C-5, C-6, NPhth), 127.86, 131.59 (2 s, C-3a, Phth), 134.27 (d, Phth), 136.62 (s, C-7a), 167.72 (s, C=O).

MS (ES'): 457 (M+OH' +H₂O, 49%), 439 (M+OH', 100%), 421 (M-H', 28%)

1-(2'-O-Benzoyl-β-D-ribo-pyranosyl)-3-(N-phthaloyl-2-aminoethyl)-indol

Unter Stickstoffatmoshäre wurde 10.6 g (25 mmol) A in 250 ml trockenem Dichlormethan aufgenommen. Man versetzt mit 305 mg DMAP (2.5 mmol) und 20 ml Pyridin. Es wurde

erwärmt bis alles in Lösung war und anschließend auf -78 °C abgekühlt. Jetzt wurde 3.35 ml Benzoylchlorid (28.8 mmol) gelößt in 8 ml Dichlormethan innerhalb von 15 min zugetropft. DC-Kontrolle (EtOAc/Hexan 3.1) nach weiteren 30 min zeigte vollständige Reaktion an. Nach 45 min wurde die kalte Lösung über einen Faltenfilter direkt auf 200 ml ges. NH₄Cl-lösung gegeben und der Filterrückstand wurde mit Dichlormethan gewaschen. Die organische Phase wurde einmal mit Wasser gewaschen, über MgSO₄ getrochnet und eingeengt. Der Rückstand wurde 2 mal mit Toluol coevaporiert und durch Flashchromatographie an 10 x 20 cm Kieselgel mit EtOAc/Hexan 3:1 gereinigt. Man erhiehlt 8.1 g **B** (64%).

¹H-NMR (CDCl₃, 300 MHz): 2.45, 2.70 (2 bs, 2 x 1 H, OH), 3.04 (t, J = 8.0 Hz, 2 H, CH₂CH₂NPhth), 3.80-4.20 (m, 5 H, H-4', H-5'ax, H-5'eq, CH₂NPhth), 4.63 (bs, 1 H, H-3'), 5.46 (dd, J = 3.5, 9.5 Hz, 1 H, H-2'), 6.03 (d, J = 9.5 Hz, 1 H, H-1'), 7.08-7.31 (m, 5 H, H-2, H-5, H-6, Bz-m-H), 7.41-7.48 (m, 1 H, H-Bz-p-H), 7.50 (d, J = 8.0 Hz, 1 H, H-7), 7.64-7.79 (m, 7 H, Phth, H-4, Bz-o-H).

¹³C-NMR (d₆-DMSO, 75 MHz): 24.40, 38.22 (2 t, <u>CH₂CH₂NPhth</u>), 65.95 (t, C-5'), 66.65 (d, C-4'), 69.55 (d, C-3'), 71.87 (d, C-2'), 79.57 (d, C-1'), 109.96 (d, C-7), 113.70 (s, C-3), 119.21, 120.21, 122.11, 122.41, 123.14 (5 d, C-2, C-4, C-5, C-6, NPhth), 128.28 (d, Bz), 128.58, 128.59 (2 s, C-3a, Bz), 129.62 (d, Phth), 132.05 (s, Phth), 133.81 (Bz), 136.97 (s, C-7a), 165.12, 168.29 (2 s, C=O).

20 MS (ES*): 525 (M-H*, 12%), 421 (M-PhCO*, 23%), 107 (100%).

1-{3'-O-Benzoyl-4'O-[(4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl]-β-D-ribo-pyranosyl}-3-(N-phthaloyl-2-aminoethyl)-indol

25

Unter Stickstoffatmoshäre wurde 8.9 g (16.9 mmol) A in 135 ml trockenem Dichlormethan suspendiert. Man versetzte mit 206 mg DMAP (1.68 mmol), 5.8 ml N-Ethyldiisopropylamin (33.7 mmol) und ca. 12 ml Pyridin (bis zur vollständigen Lösung). Jetzt wurde mit 34 g Molsieb 4A versetzt und 30 min gerührt. Nach Abkühlen auf 0 °C wurde mit 11.4 g DMTCl (33.7 mmol) versetzt und nach Entfernen des Kühlbads 75 min gerührt. Dann wurden nochmals 1.94 g (0.34 eq) und nach weiteren 40 min 1.14 g (0.2 eq) und nach weiteren 65 min 1.14 g DMTCl (0.2 eq) zugegeben. Nach 4.25 h war die Reaktion beendet. Man versetzte dann mit 25.3 ml n-Propanol (20 eq), rührte noch 30 min nach und engte dann vorsichtig ein (Schaumbildung). Der Rückstand wurde in 100 ml Pyridin gelößt. Man versetzte mit 1.85 g DMAP (15.1 mmol; 0.9 eq), 13.05 ml N-Ethyldiisopropylamin (101 mmol; 6.0 eq), 71 mi n-Propanol (940 mmol; 56 eq) und 3.74 g p-Nitrophenol (26.9 mmol; 1.6 eq). Diese Mischung wurde unter Stickstoff 96 h bei 75-80 °C gerührt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wurde die Mischung über Celite filtiert und eingeengt. Der Rückstand wurde durch Flashchromatographie 9 an 17 Kieselgel Toluol/Diethylether/Triethylamin 90:10:1 gereinigt. Die produkthaltuigen Fraktionen (9.25 g) wurden zunächst aus EtOAc umkristallisiert und anschließend aus Toluol/Methanol umgefällt. Man erhielt 5.86 g B (42%).

¹H-NMR (CDCl₃, 300 MHz): 2.64 (bs, 1 H, OH), 2.68 (dd, J = 5.0, 11.5 Hz, 1 H, H-5'eq), 2.94 (dd, J = 7.5, 16.0 Hz, 1 H, $C\underline{H}_2CH_2NPhth$), 3.03 (dd, J = 8.0, 16.0 Hz, 1 H, $C\underline{H}_2CH_2NPhth$), 3.67-3.74 (m, 1 H, H-5'ax), 3.69, 3.70 (2 s, 2 x 3 H, OMe), 3.85 (t, J = 7.5 Hz, 2 H, $C\underline{H}_2C\underline{H}_2NPhth$), 3.94 (ddd, J = 3.0, 5.0, 10.5 Hz, 1 H, H-4'), 4.03 (dd, J = 3.5, 9.0 Hz, 1 H, H-2'), 5.51 (d, J = 9.0 Hz, 1 H, H-1'), 5.86 (bs, 1 H, H-3'), 6.68-7.66 (m, 25 H), 8.19-8.30 (m, 2 H).

¹³C-NMR (CDCl₃, 75 MHz): 24.16, 38.80 (2 t, CH₂CH₂NPhth), 55.25, 55.26 (2 q, Ome), 65.58 (t, C-5'), 68.29, 69.19, 73,83 (3 d, C-2', C-3', C-4'), 83.03 (d, C-1'), 87.31 (CAr₃)110.03 (d, C-7), 113.37, 113.47 (2 d), 113.53 (s, C-3), 118.95, 120.20, 122.28, 122.31, 123.10, 127.07, 128.02, 128.08, 128.68 (9 d), 128.74 (s), 130.02, 130.19, 130.22 (3 d), 130.37, 131.95 (2 s), 133.40, 133.83 (2 d), 135.98, 136.14, 136.56, 145.12, 158.82, 166.76, 168.52 (7 s, C-7a, 2 COMe, 2 C=O).

10

15

20

1-{2'O-(Allyloxy)(diisopropylamino)phosphino)-3'-O-Benzoyl-4'O-{(4,4'-dimethoxytriphenyl)-methyl]-β-D-ribo-pyranosyl}-3-(N-phthaloyl-2-aminoethyl)-indol (2 Diastereomere)

Unter Argonatmosphäre wurde 1658 mg Alkohol A (2.0 mmol) in 10 ml trockenem Dichlormethan gelößt. Man versetzte mit 1.03 ml N-Ethyldiisopropylamin (6.0 mmol) und 0.63 ml Phosphorigsäuremonoallylesterdiisopropylamidchlorid (2.8 mmol) und rührte 1 h bei Raumtemperatur. Dann wurde das überschüssige Phosphorylierungsreagenz durch Zugabe von 61 µl (0.8 mmol) Isopropanol zerstört. Nach 10 min wurde im Vakuum eingeengt und der Rückstand durch Flashchromatographie an 3.3 x 21 cm Kieselgel mit Hexan/EtOAc/NEt₃ (75:25:1) gereinigt. Die produkthaltigen Fraktionen wurden eingeengt, in CCl₄ aufgenommen und wieder eingeengt. Man erhielt 2.04 g eines fast farblosen Schaums (quant.), der so direkt zur Oligomerisierung verwendet werden kann und bei -20 °C mehrere Wochen haltbar ist.

DC auf Kieselgel (EtOAc/Hexan/ NEt₃ 33:66:1): 0.41

¹H-NMR (CDCl₃, 300 MHz): Ausgewählte charakteristische Lagen: 2.42, 2.53 (2 dd, J = 5.0, 11.0 Hz, 2 H, 2 H-5'eq), 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 (4 s, 4 x 3 H, OMe), 5.70, 5.73 (2 d, J = 9.0 Hz, 2 H, 2 H-1'), 6.16, 6.29 (2 bs, 2 H, 2 H-3').

³¹P-NMR (CDCl₃): 150.6, 151.0

5.3 Lysin-basierender Linker

25 Die Synthese ist im Schema 7 abgebildet und wird im folgenden im Detail beschrieben.

Schema 7: Synthese des Lysinlinkers

10

15

20

6-Amino-2(S)-hydroxyhexansäure (1) wurde nach literaturbekannter Weise durch Diazotierung und anschließebnde Hydrolyse aus L-Lysin hergestellt (K.-I. Aketa, Chem. Pharm Bull. 1976, 24, 621).

2-(S)-N-Fmoc-6-amino-1,2-hexandiol (2)

3.4 g LiBH₄ (156 mmol, 4 eq) werden unter Argon in 100 ml abs. THF gelöst (exotherm!). Nach Abkühlen auf ca. 30 °C werden 39.6 ml TMSCl (312 mmol, 8 eq) langsam zugetropft (Gasentwicklung!), wobei sich ein Niederschlag bildet. Anschließend werden im Argon-Gegenstrom 5.74 g 6-Amino-2(S)-hydroxyhexansäure (1) (39 mmol) portionsweise zugegeben und es wird auf 65 °C erwärmt, bis das DC (Kieselgel; i-PrOH/konz. NH₄OH/Wasser 7:2:1; Anfärben mit Ninhydrin) kein Edukt mehr zeigt (ca. 3 h). Unter Eiskühlung wird vorsichtig mit 120 ml Methanol versetzt (starke Gasentwicklung!). Das Lösungsmittel wird im Vakuum eingeengt, der Rückstand wird 3 mal mit je 200 ml Methanol coevaporiert und anschließend in 100 ml abs. DMF gelöst. Nach Zugabe von 16 ml Ethyldiisopropylamin (93.6 mmol, 2.4 eq) wird die Mischung auf 0°C gekühlt und portionsweise mit 12.1 g FmocCl (46.8 mmol, 1.2 eq) versetzt. Nach 15 Minuten wird das Kühlbad entfernt und bei Raumtemperatur gerührt bis das Edukt verbraucht ist (ca. 3 h; DC-Kontrolle: Kieselgel; CHCl₃/MeOH/HOAc/Wasser 60:30:3:5). Die Reaktionslösung

15

20

30

wird auf 600 ml ges. NaHCO₃-Lösung gegeben. Der Niederschlag wird abfiltriert, mit 200 ml Wasser gewaschen und bei 50 °C am HV getrocknet bis zur Gewichtskonstanz (ca. 6 h). Man erhält 13.9 g eines farblosen Feststoffs, der aus Ethylacetat (40 ml)/n-Hexan (35 ml) umkristallisiert wird. Ausbeute: 9.05 g (65%).

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 7.68, 7.51 (2 d, J = 8.0 Hz, je 2 H, Ar-H), 7.32 (t, J = 8.0 Hz, 2 H, Ar-H), 7.23 (dt, J = 1.6, 8.0 Hz, 2 H, Ar-H), 4.92 (bs, 1 H. NH), 4.32 (d, J = 7.0 Hz, 2 H, OCOCH₂), 4.13 (bt, J = 7.0 Hz, 1 H, OCOCH₂C<u>H</u>), 3.64-3.58 (m, 1 H, H-1, H-1', H-2, H-6, H-6'), 3.54 (dd, J = 3.2, 11.0 Hz, 1 H, H-1, H-1', H-2, H-6, H-6'), 3.35 (dd, J = 7.4, 11.0 Hz, 1 H, H-1, H-1', H-2, H-6, H-6'), 3.16-3.06 (m, 2 H, H-1, H-1', H-2, H-6, H-6'), 3.0-2.0 (bs, 2 H, OH), 1.52-1.18 (m, 6 H, H-3, H-3', H-4, H-4', H-5, H-5').

2-(S)-N-Fmoc-O¹-DMT-6-amino-1,2-hexandiol (3) wurde nach WO 89/02439 DM-trityliert.

2-(S)-N-Fmoc-O¹-DMT-O²-allyloxydiisopropylaminophosphinyl-6-amino-1,2-hexandiol (4)

Zu einer Lösung von 670 mg des Alkohols (3) (1.02 mmol) in 10 ml abs. Dichlormethan werden unter Argon 0.51 ml Ethyldiisopropylamin (3.0 mmol, 3 eq) und 0.33 ml Chlor-N,N-diisopropylaminoallyloxyphosphin (1.5 mmol, 1.5 eq) gegeben. Man rührt 2 h bei Raumtemperatur, zieht das Lösungsmittel im Vakuum ab und reinigt den erhaltenen Rückstand durch Flashchromatographie an 3.2 x 16 cm Kieselgel (EtOAc/iso-Hexan/NEt₃ 20:80:1). Man erhält 839 mg (97%) eines leicht gelblichen Öls.

DC: Kieselgel; EtOAc/iso-Hexan/NEt₃ 50:50:1; UV; $R_f = 0.77$.

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 7.70-6.68 (m, 21 H, Ar-H), 4.92-4.62 (m, 1 H. NH), 4.31 (d, J = 7.0 Hz, 2 H, OCOCH₂), 4.13 (t, J = 7.0 Hz, 1 H, OCOCH₂CH), 3.98-3.40 (m, 5 H), 3.77 (2 s, je 3 H, OMe), 3.16-2.86 (m, 4 H), 2.58 (t, J = 7.0 Hz, 1 H, CHCN), 2.38 (t, 1 H, CHCN), 1.80-1.20 (m, 6 H), 1.20, 1,18, 1.17, 1.16, 1.15, 1.13, 1.08, 1.06 (8 s, 12 H, NMe).

³¹P-NMR (300 MHz, CDCl₃): 149.5, 149.0 (2 s)

Beispiel 6

10

25

30

Synthese eines p-RNA-Oligos der Sequenz 4'-Indollinker-A8-2' unter Verwendung von Benzimidazoliumtriflat als Kupplungsreagenz

108 mg Indollinker-Phosphoramidit und 244 mg A-Phosphoramidit werden in Synthesizergläschen eingewogen und für 3 h im Exsikkator über KOH zusammen mit dem mit 28,1 mg CPG-Träger, beladen mit A-Baustein, gefüllten Säulchen am HV belassen. Die Phosphoramidite werden in 1 ml (Indollinker) bzw. 2,5 ml (A-Phosphoramidit) Acetonitril gelöst und einige Kügelchen von dem Molsieb zugesetzt und über KOH geschlossen im Exsikkator belassen.

200 mg Jod werden unter starkem Rühren in 50 ml Acetonitril gelöst. Nachdem alles gelöst ist (Sichtkontrolle) werden 23 ml Wasser und 4,6 ml sym-Collidin zugegeben und die Lösung einmal gut durchmischt. Zum Detritylieren wird eine 6 %ige Lösung von Dichloressigsäure in Dichlormethan eingesetzt. Das Cappingreagenz (Acetanhydrid + Base) wird wie für Oligonucleotidsynthese üblich gekauft und verwendet.

Benzimidazoliumtriflat wird aus heißem Acetonitril umkristallisiert und getrocknet. Mit den fast farblosen Kristallen wird eine 0,1 M Lösung in wasserfreiem Acetonitril als Kupplungsreagenz hergestellt. Während der Synthese bleibt diese Lösung immer klar und es kommt zu keinen Verstopfungen der Synthesizerschläuche.

Abgeänderter DNA-Kupplungscyclus am Eppendorf Ecosyn 300+ (DMT-on):

Detritylierung 7 Minuten

Kupplung

1 Stunde

Capping

1,5 Minuten

Oxidation

1 Minute

20 mg Tetrakis(triphenylphosphin)palladium wird in 1,5 ml Dichlormethan gelöst, 20 mg Diethylammoniumhydrogencarbonat, 20 mg Triphenylphosphin und der das Oligonucleotid tragende Glasträger zugesetzt, dicht verschlossen (Parafilm) und das Gläschen 5 h bei RT.

bewegt. Dann wird der Glasträger über eine Analysennutsche abgesaugt, und mit Dichlormethan, mit Aceton und mit Wasser gewaschen.

Der Träger wäßriger 0,1molarer Natriumdiethyldithiocarbamatlösung wird mit aufgeschlämmt und 45 min bei RT. belassen. Man saugt ab, wäscht mit Wasser, Aceton, Ethanol und Dichlormethan. Der Träger wird in 1,5 ml 24 %iger Hydrazinhydratlösung suspendiert, 24-36 lang bei 4 °C gerütteit und mit 0,1molarem Triethylammoniumhydrogencarbonatpuffer (TEAB-Puffer) auf 7 ml verdünnt. Über eine Waters Sep-Pak Cartridge wurde hydrazinfrei gewaschen. Es wird mit 5 ml einer 80%igen Ameisensäurelösung versetzt, und nach 30 min zur Trockene einrotiert. Der Rückstand wird in 10 ml Wasser aufgenommen, mit Dichlormethan extrahiert, die wäßrige Phase eingeengt und nun HPL-chromatographiert (tR = 33 min, Gradient von Acetonitril in 0,1M Triethylammoniumacetat-Puffer). Übliche Entsalzung (Waters Sep-Pak Cartridge) liefert das Oligonucleotid.

15 Ausbeute: 17, 6 OD.

Substanzidentität nachgewiesen durch ESI-Massenspektroskopie:

$$M(ber) = 3082 D, (M+2H)^{2+}(gef) = 1541.9 D.$$

Beispiel 7

30

20 Herstellung von Konjugaten

1. Sequentielles Verfahren

Zuerst wird, wie in Beispiel 2 beschrieben, ein p-RNA-Oligomeres der Sequenz Ax, d. h. ein Octamer, auf dem Eppendorf Ecosyn D 300+ hergestellt und dann die folgenden Reagenzien ausgetauscht: 6 %ige Dichloressigsäure gegen 2 %ige Trichloressigsäure, Jod in Collidin gegen Jod in Pyridin, Benzimidazoliumtriflatlösung gegen Tetrazollösung. Nach Änderung des Syntheseprogramms wird ein DNA-Oligomeres der Sequenz GATTC nach bekannten Methoden (M. J. Gait, Oligonucleotide Synthesis, IRL Press, Oxford, UK 1984) weiter synthetisiert. Die Deallylierung, Hydrazinolyse, HPL-Chromatographie und Entsalzung erfolgt wie für das p-RNA-Oligomere beschrieben (siehe oben) und liefert das gewünschte Konjugat.

2. Konvergentes Verfahren

Wie in Beispiel 2 beschrieben, wird ein p-RNA-Oligomeres mit der Sequenz 4'-Indollinker-A₈-2' hergestellt, aufgereinigt, und jodacetyliert. Ein DNA-Oligomeres der Sequenz GATTC-Thiol-Linker wird nach bekannten Methoden (M. J. Gait, Oligonucleotide Synthesis, IRL Press, Oxford, UK 1984) synthetisiert und aufgereinigt (3'-Thiol-Linker von Glen Research: Nr. 20-2933). Beim Stehenlassen der beiden Fragmente (T. Zhu et al., Bioconjug. Chem. 1994, 5, 312) in gepufferter Lösung entsteht das Konjugat, das abschließend über HPLC aufgereinigt wird.

Beispiel 8

10

15

20

Konjugation eines Biotinrestes an eine aminomodifizierte p-RNA:

Zuert wurde analog wie in Beispiel 6 beschrieben, ein p-RNA Oligomer der Sequenz TAGGCAAT, welches am 4'-Ende mittels des 5'-Aminomodifier 5 von Eurogentec (2-(2-(4-Monomethoxytrityl)aminoethoxy)ethyl-(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)-phosphoramidit) mit einer Aminogruppe versehen ist, synthetisiert und aufgearbeitet. Das Oligonucleotid (17,4 OD, 0,175 μmol) wurde in 0,5 ml basischem Puffer aufgenommen, 1,14 mg (2,5 μmol) Biotin-N-hydroxysuccinimidester in 114 μl DMF (abs.) gelöst und 1h bei RT stehengelassen. Das entstandene Konjugat wurde mittels präparativer HPLC gereinigt und das reine Produkt mit einer Sepak entsalzt.

25 Ausbeute: 8.6 OD (49%)
M (ber.) = 3080 D, M (fef) = 3080,4 D

Beispiel 9

Herstellung Cyanin- bzw. Biotin-markierter p-RNA online

20

25

30

Die verschiedenen A,T,G,C und Ind (Ind = Aminoethylindol als Nucleobase) Phosphoramidite wurden zuerst nach bekannten Verfahren hergestellt. Cyanin (Cy3-CE) und Biotin Phosphoramidite wurden bei Glen Research erhalten.

Die vollautomatische Festphasensynthese wurde mit jeweils 15 µmol durchgeführt. Ein Synthesezyklus besteht aus den folgenden Schritten

- (a) Detritylierung: 5 Minuten mit 6% DCA (Dichloressigsäure) in CH₂Cl₂ (79 ml);
- (b) Waschen mit CH₂Cl₂ (20 ml), Acetonitril (20 ml) und danach spülen mit Argon;
- 10 (c) Kupplung: Waschen des Harz mit dem Aktivator (0,5 M Pyridin.HCl in CH₂Cl₂, 0,2 ml;
 - 30-minütiges Behandeln mit Aktivator (0,76 ml) und entsprechendes Phosphoramidit (0,76 ml : 8 eq; 0,1 M in Acetonitril) im Verhältnis 1:1;
 - (d) Capping: 2 Minuten mit 50% Cap A (10,5 ml) und 50% Cap B (10,5 ml) von Perseptive (Cap A: THF, Lutidine, Acetanhydrid; Cap B: 1-Methylimidazol, THF, Pyridin).
 - (e) Oxidation: I Minute mit 120 ml Iodlösung (400 mg Jod in 100 ml Acetonitril, 46 ml H₂O und 9,2 ml sym-Collidine).
 - (f) Waschen mit Acetonitril (22 ml).

Zur Erleichterung der nachfolgenden HPLC-Reinigung der Oligonucleotide wurde die letzte DMT(Dimethoxytrityl)- bzw. MMT (Monomethoxytrityl)-Schutzgruppe von Biotin-bzw. Cyanin-Monomeren nicht abgespalten. Der Nachweis der letzten Kupplung mit den modifizierten Phorphoramiditen erfolgt nach der Synthese mit 1% des Harzes mittels Tritylkationabsorption in UV (503 nm).

Aufarbeitung des Oligonucleotids:

Die Abspaltung der Allyletherschutzgruppen erfolgte mit einer Lösung von Tetrakis(triphenylphosphin)palladium (272mg), Triphenylphosphin (272 mg) und Diethylammoniumhydrogencarbonat in CH₂Cl₂ (15ml) nach 5 Stunden bei RT. Die Glasträger werden danach mit CH₂CL₂ (30ml), Aceton (30ml) und Wasser (30ml)

20

25

30

gewaschen. Um Palladiumkomplexreste zu entfernen, wurde das Harz mit einer wäßrigen 0,1 M Natriumdiethyldithiocarbamathydratlösung gespült. Die oben erwähnte Waschoperation wurde in einer umgekehrten Reihe noch einmal durchgeführt. Anschließend wurde das Harz am Hochvakuum 10 Minuten getrocknet. Der Abspaltungsschritt vom Glasträger bei gleichzeitiger Debenzoylierung wurde in 24% Hydrazinhydratlösung (6ml) bei 4°C durchgeführt. Nach HPLC-Kontrolle an RP 18 (18-25 Stunden) wurde das Oligonucleotid "Trityl ON" mittels einer aktiviert (Acetonitril, 20 ml) Waters Sep-Pak Cartridge vom Hydrazin befreit. Das Hydrazin wurde mit TEAB 0,1M (30ml) gewaschen. Das Oligonucleotid wurde dann mit Acetonitril/TEAB 0,1M (10ml) eluiert. Man reinigte mittels HPLC (zur Abtrennung von Abbruchsequenzen) und führte die DMT-Entschützung (30 ml 80%ig wäßrige Ameisensäure) durch. Abschließende Entsalzung (über Sep-Pak Kartuche, mit TEAB Puffer 0,1M/Acetonitril: 1/1) lieferte die reinen Cyanin- bzw. Biotinmarkierten Oligomeren.

Ein Aliquot dieser Oligolösung wurde für die Durchführung einer ESI-MS verwendet.

4' Cy-AIndTTCCTA 2': berechnet M = 3026, gefunden $(M+H)^{-} = 3027$.

4' Biotin-TAGGAAIndT 2': berechnet M = 3014, gefunden $(M+2H)^{2+}$ m/z 1508 und $(m+H)^{-}$ m/z 3015.

Die Oligos wurden zur Lagerung gefriergetrocknet.

Beispiel 10

Jodacetylierung von p-RNA mit N-(jodacetyloxy)-succinimid

p-RNA-Sequenz : 4' AGGCAIndT 2' $M_w = 2266,56$ g/mol (Ind = Indol-CH₂-CH₂-NH₂-Linker)

1 eq. der p-RNA wurde in einer 0,1 molaren Natriumhydrogencarbonatlösung (pH 8,4) gelöst (1 ml pro 350 nmol) und mit einer Lösung von N-(jodacetyloxy)-succinimid in DMSO versetzt (40 μl pro mg). Man dunkelte den Ansatz mit Aluminiumfolie ab und beließ ihn bei Raumtemperatur für 30-90 Minuten.

WO 99/15539

PCT/EP98/05997

- 57 -

Der Fortgang der Reaktion wurde mittels analytischer HPLC verfolgt. Die Standardbedingungen sind:

Puffer A: 0,1 molarer Triethylammoniumacetat-Puffer in Wasser

Puffer B: 0,1 molarer Triethylammoniumacetat-Puffer in Wasser: Acetonitril 1:4

Gradient: von 10% B startend auf 50% B in 40 Minuten

Säulenmaterial: 10 μM LiChrosphere ® 100 RP-18 von Merck Darmstadt GmbH; 250 x 4

mm

Retentionszeit der Edukte: 18,4 Minuten

Retentionszeit der Produkte in diesem Falle: 23,1 Minuten

Nach beendeter Reaktion wurde der Ansatz mit Wasser auf das vierfache Volumen verdünnt. Man aktivierte eine Waters Sep-Pak-Kartusche RP-18 (ab 15 OD 2 g Füllung) mit 2 x 10 ml Acetonitril und 2 x 10 ml Wasser, trug das Oligo auf, ließ es einsinken, wusch das Reaktionsgefäß mit 2 x 10 ml Wasser, wusch mit 3 x 10 ml Wasser nach, um Salz und Reagenz zu entfernen, und eluierte zuerst mit 5 x 1 ml 50:1 Wasser : Acetonitril und anschließend mit 1:1. Das Produkt eluierte in den 1:1-Fraktionen in sehr guter Reinheit. Die Fraktionen wurden in der Kälte und im Dunkeln eingeengt, vereinigt, und wieder eingeengt.

Die Ausbeuten wurden mittels UV-Absorptionspektrometrie bei 260 nm bestimmt. 20

Massenspektrometrie:

Sequenz:

4' AGGCAInd(CH₂CH₂NHCOCH₂-I)T 2'

berechnete Masse:

2434,50 g/mol

gefundene Masse MH_2^{2+} : 1217,9 g/mol = 2433 g/mol

25

Beispiel 11

Konjugation von p-RNA an ein Peptid der Sequenz CYSKVG:

Die jodacetylierte p-RNA ($M_w = 2434,50$ g/mol) wurde in einem Puffersystem gelöst 30 (1000µl pro 114 nmol) und dann mit einer Lösung des Peptides in Puffer versetzt (2 mol CYSKVG-Peptid; $M_w = 655$, 773 g/mol; 228 nmol in 20 μ l Puffer).

WO 99/15539

PCT/EP98/05997

- 58 -

Wasser: Acetonitril 1:1. Die Produkt-Fraktionen wurden eingeengt, vereinigt und wieder eingeengt.

Die Ausbeuten wurden mittels UV-Absorptionspektrometrie bei 260 nm bestimmt. Sie erreichten 70-95% der Theorie.

5

Massenspektrometrie:

Sequenz:

4' AGGCAInd(CH₂CH₂NHCOCH₂-CYSKVG)T 2'

berechnete Masse:

2962,36 g/mol

gefundene Masse MH₂²⁺:

1482.0 g/mol = 2962 g/mol

10

Beispiel 12

Konjugation von p-RNA an eine Peptidbibliothek

Die jodacetylierte p-RNA (M_w = 2434,50 g/mol wurde in einem Puffersystem gelöst (1300 μl pro 832 nmol) und dann mit einer Lösung der Peptidbibliothek (CKR-XX-OH); X = Arg, Asn, Glu, His, Leu, Lys, Phe, Ser, Trp, Tyr) in Puffer versetzt (8 mol; mittlere Molekülmasse M_m = 677,82 g/mol; 4,5 mg = 6,66 μmol in 200 μmol Puffer).

Puffersystem: Borax/HCl-Puffer der Firma Riedel-de Haen, pH 8,0, wurde im Verhältnis 1:1 mit einer 10 millimolaren Lösung von EDTA-Dinatriumsalz in Wasser gemischt und auf pH 6,6 mit HCl eingestellt. Man erhielt dadurch eine Lösung, die 5 mM Na₂EDTA enthält.

Man beließ den Ansatz bis zum vollständien Umsatz bei Raumtermperatur im Dunkeln. Die Reaktion wurde mittels HPLC-Analytik verfolgt. In diesem Fall war das Edukt nach 70 Stunden verschwunden.

Die Standardbedingungen der analytischen HPLC sind:

Puffer A: 0,1 molarer Triethylammoniumacetat-Puffer in Wasser

Puffer B: 0,1 molarer Triethylammoniumacetat-Puffer in Wasser:Acetonitril 1:4

Gradient: von 10% B startend auf 50% B in 40 Minuten

Säulenmaterial: 10 µM LiChrosphere® 100 RP-18 von Merck Darmstadt GmbH; 250 x 4

- 59 -

Retentionszeit des Eduktes: 18,8 Minuten

Retentionszeit des Produktes: mehrere Peaks von 13,9-36,2 Minuten

Nach beendeter Reaktion wurde der Ansatz mit Wasser auf das vierfache Volumen verdünnt. Man aktivierte eine Waters Sep-Pak-Kartusche RP-18 (ab 15 OD 2g Füllung) mit 3 x 10 ml Acetoniril und 3 x 10 ml Wasser, trug das Oligo auf, ließ es einsinken, wusch das Reaktionsgefäß mit 2 x 10 ml Wasser nach, wusch die Kartusche mit 3 x 10 ml Wasser nach, um Salz und überschüssiges Peptid zu entfernen, und eluierte mit 1:1 Wasser : Acetonitril, bis UV-spektroskopisch kein Prodikt mehr eluierte. Die Franktionen wurden in Kälte und im Dunkeln eingeengt, vereinigt und wieder eingeengt.

Patentansprüche

5

10

15

20

1. Pentopyranosyl-Nucleosid der Formel (I),

worin

R¹ gleich H, OH. Hal mit Hal gleich Br oder Cl oder ein Rest ausgewählt aus

R², R³ und R⁴ unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils H, Hal mit Hal gleich Br oder Cl, NR⁵R⁶, OR⁷, SR⁸, =O, C_nH_{2n+1} mit n eine ganze Zahl von 1-12, vorzugsweise 1-8, insbesondere 1-4, eine β-eliminierbare Gruppe, vorzugsweise eine Gruppe der Formel -OCH₂CH₂R¹⁸ mit R¹⁸ gleich ein Cyano- oder p-Nitrophenylrest oder ein Fluorenylmethyloxycarbonyl-(Fmoc)-Rest, oder (C_nH_{2n})NR¹⁰R¹¹ mit R¹⁰R¹¹ gleich H, C_nH_{2n+1} oder R¹⁰R¹¹ verbunden über einen Rest der Formel

10

15

worin R¹², R¹³, R¹⁴ und R¹⁵ unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils H, OR⁷, wobei R⁷ die oben genannte Bedeutung hat, oder C_nH_{2n+1}, oder C_nH_{2n-1}, wobei n die oben genannte Bedeutung hat, bedeuten und

 R^5 , R^6 , R^7 und R^8 unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils H, C_nH_{2n+1} , oder C_nH_{2n-1} , wobei n die oben genannte Bedeutung hat, $-C(O)R^9$ mit R^9 gleich ein linearer oder verzweigter, gegebenenfalls substituierter Alkyl-, Aryl-, vorzugsweise Phenyl-Rest,

X, Y und Z unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils =N-, = $C(R^{16})$ oder - $N(R^{17})$ - mit R^{16} und R^{17} unabhängig voneinander, gleich oder verschieden,
jeweils H oder C_nH_{2n+1} oder $(C_nH_{2n})NR^{10}R^{11}$ mit den oben genannten Bedeutungen,
bedeutet, und

S_{c1} und S_{c2} unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils H oder eine Schutzgruppe ausgewählt aus einer Acyl-, Trityl- oder Allyloxycarbonylgruppe, vorzugsweise eine Benzoyl- oder 4, 4'-Dimethoxytrityl-(DMT-)gruppe,

oder der Formel (II)

15

20

(II),

worin R1 gleich H, OH, Hal mit Hal gleich Br oder Cl, oder ein Rest ausgewählt aus

 $R^{2'}, R^{3'}$ und $R^{4'}$ unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils H, Hal mit Hal gleich Br oder Cl, =O, C_nH_{2n+1} oder $-C_nH_{2n-1}$, eine β -eliminierbare Gruppe, vorzugsweise eine Gruppe der Formel $-OCH_2CH_2R^{18}$ mit R^{18} gleich ein Cyano- oder p-Nitrophenylrest oder ein Fluorenylmethyloxycarbonyl-(Fmoc)-Rest, oder $(C_nH_{2n})NR^{10'}R^{11'}$, wobei $R^{10'}$, $R^{11'}$, unabhängig voneinander die oben genannte Bedeutung von R^{10} bzw. R^{11} hat, und

X', Y' und Z' unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils =N-, =C($R^{16'}$)- oder -N($R^{17'}$)- bedeutet, wobei $R^{16'}$ und $R^{17'}$ unabhängig voneinander die oben genannte Bedeutung von R^{16} bzw. R^{17} haben, und S_{c1} bzw. $S_{c2'}$ die oben genannte Bedeutung von S_{c1} bzw. S_{c2} haben,

ausgenommen 4'-DMT-3'-benzoyl-ribopyranosyl-N-benzoyl-adenosin, N⁶,N⁶-Dibenzoyl-9-(2'-O-benzoyl-\beta-D-ribo-pyranosyl)-adenosin, Ribopyranosyl-N-benzoyl-adenosin, 4'-DMT-3'-benzoyl-ribopyranosyl-urazil und Ribopyranosyl-urazil.

WO 99/15539 PCT/EP98/05997

Pentopyranosyl-Nucleosid nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Pentopyranosyl-Nucleosid ein Ribo-, Arabino-, Lyxo- und/oder Xylo-pyranosyl-Nucleosid, vorzugsweise ein Ribopyranosyl-Nucleosid, ist.

- 63 -

- Pentopyranosyl-Nucleosid nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Pentopyranosyl-Teil D- oder L-konfiguriert ist.
 - 4. Pentopyranosyl-Nucleosid nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß als Pentopyranosyl-Nucleosid ein Pentopyranosyl-purin, -2,6-diaminopurin, -6purinthiol, -pyridin, -pyrimidin, -adenosin, -guanosin, -isoguanosin, -6-thioguanosin, xanthin, -hypoxanthin, -thymidin, -cytosin, -isocytosin, -indol, -tryptamin, -Nphthaloyltryptamin, -uracil, -coffein, -theobromin, -theophyllin, -benzotriazol oder acridin, eingesetzt wird.

10

20

25

30

- Pentopyranosyl-Nucleosid nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, 15 daß R², R³, R⁴, R², R³ und/oder R⁴ ein 2-Phthalimidoethyl- oder Allyloxy-Rest oder ein Rest der Formel -N[C(O)R⁹]₂ bedeutet.
 - 6. Pentopyranosyl-Nucleosid nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, [2',4'-Di-O-Benzoyl-β-ribopyranosyl]daß Pentopyranosyl-Nucleosid ein das Nucleosid, insbesondere ein [2',4'-Di-O-Benzoyl)-\(\beta\)-ribopyranosyl]-adenin, -guanin, cytosin, -thymidin, -uracil, -xanthin oder hypoxanthin, ein N-Benzoyl-2',4'-di-Obenzoyl-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein -adenin, -guanin oder -cytosin, ein N-Isobutyroyl-2',4'-di-O-benzoyl-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein -adenin, guanin oder -cytosin, ein O⁶-(2-Cyanoethyl)-N²-isobutyroyl-2',4'-di-O-benzoylribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein -guanin, ein O⁶ (2-(4-Nitrophenyl)ethyl)-N²isobutyroyl-2',4'-di-O-benzoyl-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein -guanin, ein β-Ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein β-Ribopyranosyl-adenin, -guanin, cytosin, -thymidin oder -uracil, -xanthin oder hypoxanthin, ein N-Benzoyl-, N-Isobutyroyl-, O⁶-(2-Cyanoethyl)- oder O⁶-(2-(4-Nitrophenyl)ethyl)-N²-isobutylroyl-βribopyranosyl-Nucleosid, ein 4'-DMT-pentopyranosyl-Nucleoside, vorzugsweise ein 4'-DMT-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein 4'-DMT-ribopyranosyl-adenin, -

10

15

25

30

guanin,- cytosin, -thymidin, -uracil, -xanthin oder hypoxanthin, ein N-Benzoyl-4'-DMT-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein N-Benzoyl-4'-DMT-ribopyranosyl-nucleosid, insbesondere ein N-Isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein N-Isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-adenin, -guanin,- oder -cytosin, ein O^6 -(2-Cyanoethyl)- N^2 -isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein O^6 -(2-Cyanoethyl)- N^2 -isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-guanin, ein O^6 -(2-(-4-Nitrophenyl) ethyl)- N^2 -isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-Nucleosid, insbesondere ein O^6 -(2-(-4-Nitrophenyl)ethyl)- N^2 -isobutyroyl-4'-DMT-ribopyranosyl-guanin, oder ein O^6 -Ribopyranosyl-N,N'-dibenzoyl-adenosin oder ein O^6 -Ribopyranosyl-N,N'-dibenzoyl-adenosin oder ein O^6 -Ribopyranosyl-N,N'-dibenzoyl-guanosin ist.

- Verfahren zur Herstellung eines Pentopyranosyl-Nucleosids der Formel (I) oder (II), gemäß einem der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, daß ausgehend von dem ungeschützten Pentopyranosid
 - (a) in einem ersten Schritt zuerst die 2'-, 3'- oder 4'-Position des Pentopyranosids geschützt wird, und vorzugsweise
 - (b) in einem zweiten Schritt die andere Position an der 2'-, 3'- oder 4'-Position.
- 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß im Falle einer 2'-geschützten
 Position eine Umlagerung der Schutzgruppe von der 2'-Position zur 3'-Position erfolgt.
 - 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Umlagerung in Gegenwart einer Base, insbesondere in Gegenwart von N-Ethyldiisopropylamin und/oder Triethylamin durchgeführt wird.
 - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7-9, dadurch gekennzeichnet, daß das Pyranosylnucleosid durch eine säurelabile, basenlabile oder metallkatalysiert abspaltbare Schutzgruppe Sc1, Sc2, Sc1 oder Sc2 geschützt wird.
 - 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7-10, dadurch gekennzeichnet, daß Sei und Sei verschieden sind von Sei bzw. Sei.

25

- 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7-11, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzgruppen S_{c1}, S_{c2}, S_{c1} oder S_{c2} ausgewählt werden aus Acylgruppen, vorzugsweise aus einer Acetyl-, Benzoyl-, Nitrobenzoyl- und/oder Methoxybenzoyl- Gruppe oder aus Tritylgruppen, vorzugsweise einer 4, 4'-Dimethoxytrityl-(DMT)- Gruppe oder aus β-elininierbaren Gruppen, vorzugsweise eine Gruppe der Formel OCH₂CH₂R¹⁸ mit R¹⁸ gleich ein Cyano- oder p-Nitrophenylrest oder eine Fluorenylmethyloxycarbonyl-(Fmoc)Gruppe.
- 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 7-12, dadurch gekennzeichnet, daß die 2'- oder 3'-Position durch eine basenlabile oder metallkatalysiert abspaltbare Schutzgruppe, vorzugsweise durch eine Acylgruppe, insbesondere durch eine Acetyl-, Benzoyl-, Nitrobenzoyl- und/oder Methoxybenzoylgruppe, geschützt wird.
- 15 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 7-13, dadurch gekennzeichnet, daß die 4'-Position durch eine säure- oder basenlabile Schutzgruppe, vorzugsweise durch eine Trityl- und/oder Fmoc-Gruppe, insbesondere durch eine DMT-Gruppe geschützt wird.
- 15. Verfahren zur Herstellung eines Pentopyranosyl-nucleosids, dadurch gekennzeichnet,
 20 daß
 - (a) eine geschützte Nucleobase mit einer geschützten Pentopyranose umgesetzt wird,
 - (b) die Schutzgruppen von dem Pentopyranosyl-Teil des Produktes aus Schritt (a) abgespalten werden, und
 - (c) das Produkt aus Schritt (b) gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 7-14 umgesetzt wird.
 - 16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die geschützte Pentopyranose Anomeren-rein ist.
- 17. Verfahren nach Anspruche 15 zur Herstellung eines Linkers gemäß Formel (II), worin R⁴ (C_nH_{2n})NR¹⁰ R¹¹ bedeutet und R¹⁰ R¹¹ über einen Rest der Formel (III) mit der in Anspruch 1 bezeichneten Bedeutung verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß

10

15

30

- (a) eine Verbindung der Formel (II) mit R⁴ gleich (C_nH_{2n})OS_{c3} oder (C_nH_{2n})Hal, worin n die oben genannte Bedeutung hat, S_{c3} eine Schutzgruppe, vorzugsweise eine Mesylat-Gruppe, und Hal Chlor oder Brom bedeutet,
- mit einem Azid umgesetzt wird,
- (b) das Reaktionprodukt aus (a) reduziert wird,
 - (c) das Reaktionsprodukt aus (b) mit einem entsprechenden Phthalimid umgesetzt wird,
 - (d) das Reaktionsprodukt aus (c) mit einer entsprechenden geschützten Pyranose umgesetzt wird, und
 - (e) die Schutzgruppen abgespalten werden, und
- (f) die Schritte gemäß einem der Ansprüche 7-16 durchgeführt werden.
 - 18. Verfahren nach Anspruch 15 zur Herstellung eines Linkers gemäß Formel (I), worin X und Y unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils $=C(R^{16})$ mit R^{16} gleich H oder C_nH_{2n} und $Z=C(R^{16})$ mit R^{16} gleich $(C_nH_{2n})NR^{10}R^{11}$ mit der in Anspruch 1 bezeichneten Bedeutung, dadurch gekennzeichnet, daß
 - (a) das entsprechende Indolin mit einer Pyranose zum Nucleosidtriol umgesetzt wird,
 - (b) die Hydroxylgruppen des Pyranosyl-Teils des Produktes aus (a) vorzugsweise mit Acylgruppen geschützt werden,
- 20 (c) das Produkt aus (b) oxidiert wird,
 - (d) die Hydroxyl-Schutzgruppen des Pyranosyl-Teils des Produktes aus (c) abgespalten werden und
 - (e) die Schritte gemäß einem der Ansprüche 7-16 durchgeführt werden.
- 19. Verfahren nach einem der Ansprüche 7-18, dadurch gekennzeichnet, daß das 4'geschützte Pentopyranosyl-nucleosid in einem weiteren Schritt phosphityliert oder an eine feste Phase gebunden wird.
 - 20. Verfahren zur Herstellung einer Pentopyranosyl-Nucleinsäure, dadurch gekennzeichnet, daß
 - (a) in einem ersten Schritt ein geschütztes Pentopyranosyl-Nucleosid gemäß einem der Ansprüche 1-6 an eine feste Phase gebunden wird und

15

- (b) in einem zweiten Schritt das gemäß Schritt (a) an eine feste Phase gebundene 3'-,
- 4'- geschützte Pentopyranosylnukleosid um ein phosphityliertes 3'-, 4'-geschütztes Pentopyranosyl-Nucleosid verlängert wird, und
- (c) Schritt (b) wiederholt wird.
- 21. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß in Schritt (a) und/oder Schritt (b) mindestens ein Pentofuranosyl-nucleosid eingebaut wird.
- 22. Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, daß als
 Kupplungsreagenz für die Verlängerung gemäß Schritt (b) saure Aktivatoren wie
 Pyridinium-Hydrochlorid, vorzugsweise p-Nitrophenyltetrazol, insbesondere
 Benzimidazoliumtriflat bei Einsatz von Phosphoramiditen und bei Einsatz von HPhosphonaten Arylsulfonylchloride, Diphenylchlorophosphonat, Pivaloylchlorid oder
 Adamantoylchlorid eingesetzt wird.
 - 23. Verfahren nach einem der Ansprüche 20-22, dadurch gekennzeichnet, daß in einem weiteren Schritt (d) die Schutzgruppen und das gebildete Oligomer von der festen Phase abgespalten wird.
- 24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Abspaltung durch Hydrazinolyse vorzugsweise in Gegenwart eines Salzes durchgeführt wird.
 - 25. Verfahren nach einem der Ansprüche 20-24, dadurch gekennzeichnet, daß in einem weiteren Schritt ein Allyloxy-Linker der Formel

 $S_{c4}NH(C_nH_{2n})CH(OPS_{c5}S_{c6})C_nH_{2n}S_{c7}$

(IV),

30

25

worin S_{c4} und S_{c7} unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils eine Schutzgruppe insbesondere ausgewählt aus Fmoc und/oder DMT,

25

S_{c5} und S_{c6} unabhängig voneinander, gleich oder verschieden, jeweils eine Allyloxyund/oder Diisopropylamino-Gruppe und n wie in Anspruch 1 bezeichnet, bedeuten, eingebaut wird.

- 5 26. Pentopyranosyl-Nucleinsäure enthaltend mindestens ein Pentopyranosyl-Nucleosid gemäß einem der Ansprüche 1-6 und vorzugsweise mindestens einen Allyloxy-Linker gemäß Ansprüch 25.
- 27. Verwendung eines Pentopyranosyl-Nucleosids der Formel (I) oder (II) gemäß einem der Ansprüche 1-6 oder einer Pentopyranosyl-Nucleinsäure gemäß Anspruch 26 zur Herstellung eines Arzneimittels, Diagnostikums und/oder elektronischen Bauteils.
 - 28. Verwendung eines Pentopyranosyl-Nucleotids der Formel (I) oder (II) gemäß einem der Ansprüche 1-6 oder einer Pentopyranosyl-Nucleinsäure gemäß Anspruch 26 zur Herstellung eines Konjugates enthaltend ein Pentopyranosyl-Nucleosid der Formel (I) oder (II) gemäß einem der Ansprüche 1-6 oder eine Pentopyranosyl-Nucleinsäure gemäß Anspruch 26 und ein Biomolekül.
- 29. Konjugat nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daß das Biomolekül ein Peptid,
 Protein oder eine Nucleinsäure ist.
 - 30. Konjugat nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, daß das Biomolekül ein Antikörper oder ein funktioneller Teil davon oder eine in ihrer natürlichen Form vorkommende DNA und/oder RNA ist.
 - 31. Diagnostikum enthaltend eine Pentopyranosyl-Nucleinsäure gemäß Anspruch 26 oder ein Konjugat gemäß einem der Anspruche 28-30.

Fig. 1.

Fig. 2A




Fig. 2B




Fig. 3

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51)	Internationale Patentklassifikation ⁶	:
	C07H 21/00, C12Q 1/68	

A3

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/15539

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

1. April 1999 (01.04.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/05997

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. September 1998

(21.09.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 41 715.9

22. September 1997 (22.09.97) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): AVENTIS RESEARCH & TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG [DE/DE]; D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MICULKA, Christian [AT/DE]; Gebeschusstrasse 36, D-65929 Frankfurt am Main (DE). WINDHAB, Norbert [DE/DE]; Akazienstrasse 28, D-65795 Hattersheim (DE). BRANDSTETTER, Tilmann [DE/DE]; Johannesatlee 41, D-65926 Frankfurt am Main (DE). BURDINSKI, Gerhard [DE/DE]; Johannesweg 2, D-56355 Nastätten (DE).
- (74) Anwälte: BARDEHLE, Heinz usw.; Galileiplatz 1, D-81679 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, CA, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenbe-17. Juni 1999 (17.06.99) richts:

- (54) Title: PENTOPYRANOSYL NUCLEOSIDE, AND PRODUCTION AND USE OF THE SAME
- (54) Bezeichnung: PENTOPYRANOSYL-NUCLEOSID, SEINE HERSTELLUNG UND VERWENDUNG

(57) Abstract

The invention relates to a pentopyranosyl nucleoside of formula (I) or formula (II), to the production of said pentopyranosyl nucleoside, and to its use for producing a therapeutic agent, a diagnostic agent and/or an electronic component.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Pentopyranosyl-Nucleosid der Formel (I) oder der Formel (II), deren Herstellung und Verwendung zur Herstellung eines Therapeutikums, Diagnostikums und/oder elektronischen Bauteils.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Моласо	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados ·	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL '	Israel	MR	Mauretanien	UG	
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Uganda
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ.	
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Usbekistan Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Jugoslawien
CM	Kamerun	- 3-	Korea	PL	Polen	ZW	Zimbabwe
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Sudan Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Int tional Application No PCT/EP 98/05997

		11.72. 30,				
A. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER C07H21/00 C12Q1/68					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	SEARCHED	and and an o				
Minimum do IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classification CO7H C12Q	ion symbols)				
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included in the fields sea	arched			
Electronic d	data base consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practical, search terms used)				
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel					
	Ordinario, accoment, with indication, where appropriate, or the re-	levani passages	Relevant to claim No.			
X	S.PITSCH ET AL.: "147. Why Penton Not Hexose-Nucleic Acids? Pyrano ('p-RNA')" HELVETICA CHIMICA ACTA., vol. 76, no. 6, 1993, pages 2161-XP002094190 BASEL CH cited in the application see the whole document, but espect p.2168, scheme 2 - p.2171, line 1	-2183,	1-29			
<u> </u>	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	n annex.			
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention lifting date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention lifting date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention. "X" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified). "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means. "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed. Date of the actual completion of the international search. "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention. "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document. S" document published prior to the international filing date but in the art. "S" document member of the same patent family.						
19	9 March 1999	22/04/1999				
Name and m	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Authorized officer Scott, J				
	Fax: (+31-70) 340-3016	30000, 0	1			

1

Int ::ional Application No PCT/FP 98/05997

Name of the state	PCT/EP 98/05997		
Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
S.PITSCH ET AL.: "122. Pyranosyl-RNA ('p-RNA'): Base-Pairing Selectivity and Potential to Replicate." HELVETICA CHIMICA ACTA., vol. 78, no. 7, 1995, pages 1621-1635, XP002096830 BASEL CH cited in the application see the whole document	1-29		
B.DOBOSZEWSKI ET AL.: "Synthesis of 3'-Deoxy-3'-C-Hydroxymethyl-aldopentopyran osyl Nucleosides and their Incorporation into Oligonucleotides. Part II." TETRAHEDRON, vol. 51, no. 45, 1995, pages 12319-12336, XP002096831 see page 12323, figure 2, first 3 compounds based on the right hand side sugar	1-4,6		
J.A.KELLEY ET AL.: "Furanose-pyranose Isomerization of Reduced Pyrimidine and Cyclic Urea Ribosides." JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY., vol. 29, no. 11, November 1986, pages 2351-2358, XP002097206 WASHINGTON US see the whole document	1-3		
CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 98, no. 13, 28 March 1983 Columbus, Ohio, US; abstract no. 107682z, H.OGURA: "Glucoside Derivatives." page 636; column 2; XP002097208 see abstract & JP 57 146796 Al0 September 1982	1-3		
M.MELGUIZO ET AL.: "A New One-Step Synthesis of 8-Aminopurines Nucleoside Analogs from 6-(glycosylamino)-5-nitrosopyrimidines." JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY., vol. 57, no. 2, 1992, pages 559-565, XP002097207 EASTON US see the whole document	1		
-/			
	('p-RNA'): Base-Pairing Selectivity and Potential to Replicate." HELVETICA CHIMICA ACTA., vol. 78, no. 7, 1995, pages 1621-1635, XP002096830 BASEL CH cited in the application see the whole document B.DOBOSZEWSKI ET AL.: "Synthesis of 3'-Deoxy-3'-C-Hydroxymethyl-aldopentopyran osyl Nucleosides and their Incorporation into Oligonucleotides. Part II." TETRAHEDRON, vol. 51, no. 45, 1995, pages 12319-12336, XP002096831 see page 12323, figure 2, first 3 compounds based on the right hand side sugar J.A.KELLEY ET AL.: "Furanose-pyranose Isomerization of Reduced Pyrimidine and Cyclic Urea Ribosides." JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY., vol. 29, no. 11, November 1986, pages 2351-2358, XP002097206 WASHINGTON US see the whole document CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 98, no. 13, 28 March 1983 Columbus, Ohio, US; abstract no. 107682z, H.OGURA: "Glucoside Derivatives." page 636; column 2; XP002097208 see abstract & JP 57 146796 A10 September 1982 M.MELGUIZO ET AL.: "A New One-Step Synthesis of 8-Aminopurines Nucleoside Analogs from 6-(glycosylamino)-5-nitrosopyrimidines." JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY., vol. 57, no. 2, 1992, pages 559-565, XP002097207 EASTON US see the whole document		

1

inte .ional Application No PCT/EP 98/05997

C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PCT/EP 98/05997		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages			
·	than including where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X	I.SCHLÖNVOGT ET AL.: "188. Pyranosyl-RNA ('p-RNA'): NMR and Molecular Dynamics Study of the DUplex Formed by Self-Pairing of Ribopyranosyl-(C-G-A-A-T-T-C-G)" HELVETICA CHIMICA ACTA:, vol. 79, no. 8, 1996, pages 2316-2345, XP002096829 BASEL CH see abstract	26-29		
A	M.BÖHRINGER ET AL.: "110. Warum Pentose- und Nicht Hexose-Nucleinsäuren? Oligonucleotide aus 2',3'-Dideoxy-B-D-glucopyranosyl-Bausteine n ('Homo-DNS'): Hersellung." HELVETICA CHIMICA ACTA., vol. 75, no. 5, 13 August 1992, pages 1416-1477, XP002096856 BASEL CH see the whole document	1-31		
P, X	M.BOLLI ET AL.: "131. Pyranosyl-RNA: Further Observations on Replication." HELVETICA CHIMICA ACTA., vol. 80, no. 6, 22 September 1997, pages 1901-1951, XP002096832 BASEL CH see abstract	26-29		
, X	WO 98 25943 A (HOECHST RESEARCH AND TECHNOLOGY DEUTSCHLAND GMBH & CO KG.) 18 June 1998 see the whole document	1-31		
CT/ISA/210 (c	ontinuation of second sheet) (July 1992)			

int :tional Application No

	mation on patent family mem	bers	PCT/EP 98/05997		
Patent document cited in search report	Publication Patent family date member(s)		y	Publication date	
WO 9825943 A	18-06-1998	DE 196515 AU 56612	60 A 298 A	18-06-1998 03-07-1998	
				·	

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

Int —tionales Aktenzeichen PCT/EP 98/05997

A. KLAS	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		TOTZE	96/0599/			
IPK 6	C07H21/00 C12Q1/68						
Nach der I	Internationalen Patentklassifikation (IRK) adas sakt						
B. RECH	internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen ERCHIERTE GEBIETE	Klassifikation und der IPK					
Recherchie	erter Mindestprüfstoff (Klassifikationesvetom und Klassifikationesvetom und Klassifikationesveto	embolo)	<u>. </u>				
IPK 6	CO7H C12Q	mbole)					
Recherchie	erte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichunger	2 Sowoit diago unto di					
l	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	i, sower diese unter die rech	erchierten Gebi	ete fallen			
Während d	er internationales Bestarat						
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenban	k (Name der Datenbank und	l evtl. verwende	te Suchbegriffe)			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang	jabe der in Betracht kommen	rden Taile				
		Detraction (Continue)	iden relie	Betr. Anspruch Nr.			
X	S.PITSCH ET AL.: "147. Why Pen	tosa- and		1.00			
	HOU HEXOSE-NUCIEIC ACIDS ? Pura	nosvi-RNA		1-29			
	I (PERNA)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
	HELVETICA CHIMICA ACTA.,						
	Bd. 76, Nr. 6, 1993, Seiten 216 XP002094190	1-2183,					
1	BASEL CH						
Ī	in der Anmeldung erwähnt						
1	see the whole document but esne	cially					
	p.2168, scheme 2 - p.2171, line 14						
		,					
		-/					
1							
1							
i							
Y Weiter	a Veröffentlichungen eind der						
		X Siehe Anhang Pal	entfamilie				
m veromenn	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichun	g, die nach den	internationalen Anmeldedatum			
	lichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, ht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung night kollid	ert sondern au	i worden ist und mit der			
	okument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen edatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist	jenden Prinzips	oder der ihr zugrundeliegenden			
L" Veröffentii scheiner	ichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von be kann allein aufgrund di	sonderer Bedei	itung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf			
anderen	im Recherchenbericht genannten Verörfentlichungsdatum einer die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie nt)	CONTROL SCHOOL SCHOOL	Derunand Datta	CDIAI wardan			
ausgefüh	nrt) angegeben ist (wie	kann nicht als auf artin	sonderer Bedeu Jerischer Tätigk	rtung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet			
eine Ben	eine Benutzung eine Ausstellung die wird mit einer oder mehreren anderen						
dem bea	nspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	"&" Veröffentlichung, die Mit	nen racimiann	nanellegeng ist			
atum des Ab	schlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des inte					
10	. März 1999						
		22/04/1999	•	ĺ			
ame und Pos	stanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bedier	nsteter				
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk			·]			
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Scott, J					
	,	30000, 0		1			

1

Inti tionales Aktenzeichen PCT/EP 98/05997

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	CT/EP 9	8/05997
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommende		
	wigate der in Bettacht kommende	n i eile	Betr. Anspruch Nr.
X	S.PITSCH ET AL.: "122. Pyranosyl-RNA ('p-RNA'): Base-Pairing Selectivity and Potential to Replicate." HELVETICA CHIMICA ACTA., Bd. 78, Nr. 7, 1995, Seiten 1621-1635, XP002096830 BASEL CH in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument		1-29
x	B.DOBOSZEWSKI ET AL.: "Synthesis of 3'-Deoxy-3'-C-Hydroxymethyl-aldopentopyran osyl Nucleosides and their Incorporation into Oligonucleotides. Part II." TETRAHEDRON, Bd. 51, Nr. 45, 1995, Seiten 12319-12336, XP002096831 see page 12323, figure 2, first 3 compounds based on the right hand side sugar		1-4,6
	J.A.KELLEY ET AL.: "Furanose-pyranose Isomerization of Reduced Pyrimidine and Cyclic Urea Ribosides." JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY., Bd. 29, Nr. 11, November 1986, Seiten 2351-2358, XP002097206 WASHINGTON US siehe das ganze Dokument	·	1-3
	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 98, no. 13, 28. März 1983 Columbus, Ohio, US; abstract no. 107682z, H.OGURA: "Glucoside Derivatives." Seite 636; Spalte 2; XP002097208 siehe Zusammenfassung & JP 57 146796 A10. September 1982		1-3
	M.MELGUIZO ET AL.: "A New One-Step Synthesis of 8-Aminopurines Nucleoside Analogs from 6-(glycosylamino)-5-nitrosopyrimidines." JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY., Bd. 57, Nr. 2, 1992, Seiten 559-565, XP002097207 EASTON US siehe das ganze Dokument		1
	-/		

Int itionales Aktenzeichen
PCT/EP 98/05997

C.(Forteets	Ung) ALS WESS ISL OU AND SE	PCT/EP	98/05997
Kategorie°	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
	Sezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
x	I.SCHLÖNVOGT ET AL.: "188. Pyranosyl-RNA ('p-RNA'): NMR and Molecular Dynamics Study of the DUplex Formed by Self-Pairing of Ribopyranosyl-(C-G-A-A-T-T-C-G)" HELVETICA CHIMICA ACTA., Bd. 79, Nr. 8, 1996, Seiten 2316-2345, XP002096829 BASEL CH siehe Zusammenfassung		26-29
	M.BÖHRINGER ET AL.: "110. Warum Pentose- und Nicht Hexose-Nucleinsäuren? Oligonucleotide aus 2',3'-Dideoxy-B-D-glucopyranosyl-Bausteine n ('Homo-DNS'): Hersellung." HELVETICA CHIMICA ACTA., Bd. 75, Nr. 5, 13. August 1992, Seiten 1416-1477, XP002096856 BASEL CH siehe das ganze Dokument		1-31
, X	M.BOLLI ET AL.: "131. Pyranosyl-RNA: Further Observations on Replication." HELVETICA CHIMICA ACTA., Bd. 80, Nr. 6, 22. September 1997, Seiten 1901-1951, XP002096832 BASEL CH siehe Zusammenfassung		26-29
, X	WO 98 25943 A (HOECHST RESEARCH AND TECHNOLOGY DEUTSCHLAND GMBH & CO KG.) 18. Juni 1998 siehe das ganze Dokument		1-31

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Int. ionales Aktenzeichen
PCT/EP 98/05997

lm Recherchenbericht	Datum der	Mitglied(er) der	Datum der
angeführtes Patentdokument	Veröffentlichung	Patentfamilie	Veröffentlichung
WO 9825943 A	18-06-1998	DE 19651560 A AU 5661298 A	18-06-1998 03-07-1998